Verksamhet Hud- och könssjukvård
Hudbehandling och dagsjukvård Sahlgrenska

Patientinformation

Till dig som ska behandlas med Ciklosporin

Läkemedelsform: Kapsel 10 mg, 25 mg, 50 mg och 100 mg

Vad är Ciklosporin?
Ciklosporin har en hämmande inverkan på kroppens immunförsvar och har använts i samband med transplantationer för att förhindra organavstötning. Medicinen används även vid behandling av olika hudsjukdomar.

När sätts behandlingen in?
Vid svår psoriasis, svårt eksem samt prurigo nodularis som inte har svarat på annan behandling.

Effekt
Effekten ses ofta inom de första veckorna av behandlingen men fortsatt förbättring kan förväntas under ytterligare några månader. Ciklosporin-behandlingen sker ofta under kortare behandlingsperioder.

Dosering
Ciklosporin doseras utifrån din vikt. Kapslarna sväljs hela och dagsdosen delas upp på morgon och kväll. Kapslarna ska inte tas ur folieförpackningen förrän du ska ta medicinen.
Kapslarna ska även skyddas mot kyla och förvaras i rumstemperatur.

Återbesök
När man står på ett läkemedel bör man komma på regelbundna återbesök. Om du inte får kallelse till återbesök är det angeläget att du kontaktar oss så att vi kan boka in uppföljning.
Första återbesöket efter start 3 mån därefter var 6:e månad.

Kontroller
Blodprover och blodtryck tas innan behandlingen påbörjas därefter tas det prover 2, 4, 8, 12 veckor efter start och därefter var 3:e månad.
Blodprover omfattar blodceller, njurfunktion, leverfunktion, blodfetter och urinprov. För kvinnor i reproduktiv ålder tas även graviditetstest.
Det är mycket viktigt att du sköter provtagningar och blodtryckskontroller.

Möjliga biverkningar
Många patienter/personer får inga biverkningar alls. Biverkningar är vanligare vid en högre dos och man försöker hitta lägsta möjliga dos som ger en god behandlingseffekt.
Biverkningar som kan förekomma är: magbesvär och illamående, trötthet, huvudvärk, darrningar, ökad behåring och svullnad av tandköttet.
Stigande blodtryck samt påverkan på njurar, lever och blodfetter kan förekomma och upptäcks vid kontrollerna.

Påverkan på blodproverna ger sällan några besvär eller obehag. Förhöjda blodfetter förekommer och i sällsynta fall kan man få en retning av levern.

Tänk på att:

Ciklosporin får inte tas under graviditet eller amning. I undantagsfall kan Ciklosporin användas under graviditet men då endast i samråd med specialistmödravården.

Under pågående infektion bör man göra uppehåll med Ciklosporin, dock ej vid lindrigare infektion såsom lättare förkylning eller blåskatarr. Kontakta gärna mottagningen för rådgivning.

Observera

Ciklosporin ”kolliderar” med flera andra läkemedel och det är därför viktigt att du alltid talar om för din läkare när du får nya mediciner att du står på Ciklosporin.
Exempel på läkemedel som inte ska tas vid Ciklosporinbehandling är:

- Vissa antibiotika (så kallade makrolider)
- Svampdödande läkemedel i tablettform
- Vissa värktabletter bl.a. antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom Naprosyn, Voltaren, Orudis, Ipren m.fl. och läkemedel med salicylsyra såsom Treo, Magnecyl, Trombyl m.fl.).
- Vissa hjärt- och blodtrycksmediciner
- Blodfettssänkande läkemedel
- Läkemedel mot epilepsi

UNDVIK ÄVEN: Grapefruktjuice samt naturläkemedel som innehåller Johannesört.

Det finns en ökad risk för hudtumörer vid behandling med Ciklosporin, och därför ska du undvika att sola under behandlingen.

Vid sjukdomskontakter – tala alltid om att du behandlas med Ciklosporin!

Kontakt

Hudbehandling och dagsjukvård Sahlgrenska 031-342 11 12 (Telesvar)
Växel Sahlgrenska (dygnet runt) 031-342 10 00
Sjukvårdsrådgivningen nås dygnet runt på telefonnummer 1177, www.1177.se
Du kan också kontakta oss via Vårdguidens e-tjänster på www.1177.se eller www.sahlgrenska.se