



## Plaquenil (hydroxiklorokin)

### Preparat

Tablett Plaquenil 200 mg.

### Effekt

Plaquenil är ett antimalariamedel som kan användas vid behandling av olika hudsjukdomar, till exempel lupus erytematosus (LE) och polymorf ljusdermatos. Medicinen dämpar sjukdomens inflammatoriska aktivitet, vilket innebär att hudutslagen minskar. Vid god effekt kan man fortsätta behandlingen i många år. Det är viktigt att man inte röker under behandlingen med Plaquenil, då rökning gör att medicinen har sämre effekt.

### Kontroller

Vid beslut om längre tids behandling utförs en ögonundersökning hos ögonläkare inom ett år från behandlingsstart (man kan avstå denna kontroll om ålder under 40 år och ingen känd ögonsjukdom). Därefter görs ny kontroll efter 5 års behandling och därefter cirka en gång per år. Om synförsämring kommer under behandling rekommenderar vi i första hand kontakt med optiker och att man meddelar oss. Blodprover tas innan behandlingen startas och därefter en gång/år.

### Eventuella biverkningar

Övergående illamående och aptitlöshet, liksom trötthet och yrsel kan förekomma. Känsligheten för sol kan öka. Ackommodationsstörningar det vill säga svårighet att fixera blicken förekommer ibland, men är en ofarlig och oftast övergående biverkan. Hörselnedsättning och muskelsvaghet kan förekomma, men är mycket ovanligt. Ögats näthinna kan i sällsynta fall påverkas vid långtidsbehandling och därför görs kontrollerna enligt ovan.

### Övrigt

**Graviditet och amning:** Behandlingen kan fortsätta, men ta kontakt med din läkare för information. Står man kvar på Plaquenil under graviditeten bör man sträva efter lägsta möjlig dos, helst <400 mg /dag.

Om du planerar att amma, kontakta din läkare för diskussion om Plaquenil.

Det görs alltid en individuell bedömning via barnläkare/BVC inför vaccination med levande försvagade vaccin till barn vars mödrar behandlats med Plaquenil från graviditetsvecka 20 och framåt och/eller under amning

**Operation:** Om du ska opereras behöver du inte göra uppehåll med Plaquenil

**Vid andra sjukdomskontakter – tala om att du har behandling med Plaquenil!**

### Kontakt

Kontakta oss i första hand via e-tjänster på [1177](tel:1177), där kan du ställa frågor om dina läkemedel och be om receptförnyelse.

Du kan också ringa 031-342 11 12 för rådgivning.

För aktuella öppettider var god se hemsida [www.sahlgrenska.se](http://www.sahlgrenska.se)