



Till dig som opererats med koldioxidlaser (CO₂)

Instruktioner för vård efter behandlingen

Du har behandlats med en laser som bränner och skär samtidigt. Med denna typ av laser kan man operera bort delar av huden utan att skada omgivande vävnad.

- Du har opererats i lokalbedövning. Bedövningen verkar mellan 1,5–6 timmar. Efteråt kan viss smärta upplevas under de första 1–2 dygna. Ta gärna paracetamol vid behov (Alvedon, Panodil).
- Ibland väljer din behandlande läkare att sy ihop såret helt eller delvis. I många fall lämnas såret öppet. Eventuella stygn tas bort via en distriktssköterskemottagning, du bör få en remiss för stygntagning med dig från besöket. I många fall lossnar stygnen av sig själva, detta är normalt. I så fall kommer din distriktssköterska att hjälpa till med omläggningen av såret.
- Det behandlade området kommer att vätska rikligt i början
- Om inget annat ordinerats av behandlande läkare ska det behandlade området läggas om med torra kompresser. Dessa kompresser byts när de fuktat igenom, vilket kan variera beroende på hur stort det behandlade området är.
- När det har slutat vätska behövs inte längre något förband
- Håll området torrt om möjligt under den första veckan efter operation. Vid tvätt och dusch sedan använd tvål försiktigt och klapptorka det behandlade området.
- Undvik vattensporter eller bastubad så länge det är sårigheter
- Skydda området från solljus om aktuellt
- Tala om för oss om du äter några mediciner
- Kom ihåg att rökstopp minst 2 veckor innan och efter kirurgi förbättrar läkningen

Uppstår några problem efter behandlingen tag kontakt med oss.

Laserbehandling ges inte under graviditet eller amning.

Obs: Laserbehandling ges inte under sommarmånaderna.

Kontakt

Har du några frågor kontakta oss gärna på Hudbehandling och dagsjukvård Sahlgrenska, Lasermottagningen, telefon 031-342 11 12