

Mycoplasma genitalium

Mycoplasma genitalium är en bakterie som är sexuellt överförbar och kan orsaka infektion i framför allt urinrör och vagina, men i enstaka fall även i ändtarmen. Risken för allvarliga komplikationer bedöms vara lägre än vid klamydiainfektion.

Mycoplasma genitalium lyder inte under smittskyddslagen. Besök och behandling är inte kostnadsfritt. Klamydia och gonorré ska ha uteslutits innan eventuell provtagning av mycoplasma.

Symptom

Man kan till exempel få flytning från urinröret, sveda vid urinering, låga buksmärtor, samt även ökad/avvikande vaginal flytning och mellanblödning.

Vid infektion i ändtarmen kan symptom som till exempel smärta, slemmig flytning och blödning förekomma.

Infektionen kan också vara helt utan symptom.

Provtagning

Provtagning sker genom urinprov eller prov med tops från vagina och/eller ändtarm.

Behandling

Den vanligaste behandlingen mot Mycoplasma genitalium är Azitromax/Azithromycin 250 mg, 2 tabletter första dagen och därefter en tablett om dagen i fyra dagar. Om bakterien är motståndskraftig (resistent) mot azitromycin ges annan antibiotika – information om eventuell resistens kommer i samband med provsvar.

Efter behandling

Vi rekommenderar att man inte har några sexuella kontakter förrän man blivit helt besvärsfri och det har gått 7–10 dagar efter avslutad behandling. Vid fortsatta besvär trots genomförd behandling rekommenderas kontrollprov 4 veckor efter avslutad behandling.

Mycoplasma genitalium omfattas inte av smittskyddslagen och är inte anmälningspliktig, men eftersom bakterien överförs vid samlag är det vid påvisad infektion viktigt att även eventuella fasta partners kommer för provtagning och vid behov behandling.

Provtagning för Mycoplasma genitalium debiteras som ett vanligt besök till sjuksköterska och medicinen skrivs ut på recept.