

Till dig som ska behandla med Solifenacin

Läkemedelsform: Filmdragerad tablett, 5 mg och 10 mg.

Vad är Solifenacin?

Solifenacin är en tablettbehandling som ursprungligen används för trängningsinkontinens och ökad urineringsfrekvens som kan förekomma hos patienter med överaktiv blåsa. Sedan ett par år används behandlingen även mot överdriven svettning. Läkemedlet blockerar signaler från nervsystemet som aktiverar svettkörtlarna genom så kallade muskarina receptorer. När dessa signaler hämmas producerar svettkörtlarna mindre svett, vilket kan minska besvär med kraftig svettning.

När sätts behandling in?

Vid svår hyperhidros som drabbar flera områden på kroppen, och ger påtagliga besvär i vardagen. Det kan till exempel vara aktuellt vid kraftig svettning från händer, armhålor, fötter eller ansikte där antiperspiranter med aluminiumklorid, lokalbehandling med Axhidrox eller Dysport (botulinumtoxin typ A) inte räcker till. Alternativt som tillägg vid behandling med Dysport när effekten börjar avta, i väntan på nästa behandlingstillfälle.

Innan behandling ges ska man ha uteslutit eventuella bakomliggande orsaker, varför basal utredning med orienterande blodprover rekommenderas via vårdcentralen.

Solifenacin ska inte användas om graviditet planeras. Behandling ges inte till gravida eller ammande kvinnor.

Dosering

Tabletten tas en gång/dygn. Oftast börjar man med ½ till 1 tablett/dag. Om man inte upplever effekt efter några gångers användning kan dosen ökas till 2 tabletter en gång per dygn.

Behandlingen tas endast vid behov. Eftersom kunskapen om långtidseffekter på Solifenacin är begränsad rekommenderar vi inte kontinuerlig behandling.

Biverkningar

Biverkningar kan förekomma, och beror på att läkemedlet blockerar kroppens muskarina receptorer även utanför urinblåsan och svettkörtlarna. Vanliga biverkningar är muntorrhet (den allra vanligaste). Andra biverkningar som kan förekomma är förstoppning, torra ögon, dimsyn eller svårighet att fokusera synen (**OBS, viktigt att tänka på inför t.ex. bilkörning**), illamående, magbesvär, trötthet och svårigheter att tömma blåsan.

Byte mellan Ditropan och Solifenacin

Solifenacin föredras framför behandling med Ditropan (Oxybutynin) på grund av bättre biotillgänglighet och gynnsammare biverkningsprofil. Solifenacin är mer selektiv och ger färre biverkningar.

Kontakt

Telefon hudmottagningen rådgivning: 031-342 38 74

Växel Sahlgrenska (dygnet runt): 031-342 10 00

Du kan även kontakta oss via vårdguidens e-tjänster på 1177.se eller sahlgrenska.se