

En hudbiopsi innebär att en några millimeter stor rund hudbit tas för att skickas på analys. Detta görs för att få hjälp att ställa diagnos på den hudåkomma som du sökt för.

Där hudbiopsin tagits har du nu ett litet runt sår. Det tar ett par veckor för detta sår att läka och du kommer få ett litet vitt ärr på platsen.

Kommer det att göra ont efteråt?

Lokalbedövningseffekten avtar efter 1-2 timmar. Vanligtvis upplevs ingen smärta men skulle du mot förmodan uppleva det, kan du använda receptfria värktabletter med preparatet paracetamol (t.ex. Alvedon eller Panodil). Undvik andra värktabletter, då de kan vara blodförtunnande.

Hur ska jag sköta såret?

- Håll förbandet torrt de närmaste 48 timmarna.
- Ta bort förbandet efter 48 timmar. Tvätta såret med tvål och vatten. Ibland har vi blodstillat med järnklorid som gör såret gulsvart. Detta går att tvätta bort och är inte farligt.
- Klapptorka därefter. Sätt på ett nytt luftigt förband vid behov (om såret vätskar sig) och skydda såret från smutsiga miljöer.
- Tvätta en gång dagligen enligt ovan tills såret läkt.
- Om såret sitter på underbenet ska du använda en stödstrumpa tills såret är läkt.
- Undvik bastu och bassängbad tills såret är läkt.

Blödning

Blödning från såret är ovanliga. Om det trots allt skulle hända sätt dig ner och tryck hårt och kontinuerligt över förbandet i minst 15 min. Var beredd på att få blåmärken om biopsin tagits på känsliga områden som t.ex. nära ögonen.

Infektionstecken

Det är förväntat att ditt sår kommer vara rött, svullet och ömt de första dagarna efter biopsin. Det är ovanligt med infektioner efter biopsier men om såret plötsligt börjar göra mer ont eller blir varmare/rödare/mer svullet, så kan en infektion ha uppstått. Ta då kontakt med oss eller med primärvården.

Hudbiopsin som togs skickas för mikroskopisk undersökning och du får besked om resultatet vanligen inom 6-8 veckor antingen via brev eller per telefon enligt överenskommelse med din läkare.