



Suturtagning efter transplantat

Meddelande till distriktssköterska

Plats för etikett

Patienten opererades för ett basaliom den

Ett fullhudstransplantat lades på (lokal)

Tacksam hjälp med suturtagning och omläggning/sårkontroller

Efter 1 vecka:

- Ta bort knytförbandet över transplantatet. Förbandet kan behöva blötas upp med natriumklorid för att lättare lossna.
- Knytsuturena, d.v.s. de **vita** suturerna som håller fast förbandet, klippas upp och tas bort. Resterande suturer, d.v.s. de tunna svarta runt transplantatet, ska sitta kvar ytterligare en vecka. Lägg om med Jelonet närmast såret och en Solvaline/sårdyna som ytterförband.
- Transplantatet brukar ha en blåviolett färg efter en vecka. Detta är helt normalt.



Knytförband ska avlägsnas efter 1 vecka genom att klippa bort de vita suturerna.



De svarta stygnen kring transplantatet avlägsnas efter 2 veckor. Den blåvioletta färgen är normal.

Efter två veckor:

- Ta bort suturerna runt transplantatet. Blöt vid behov upp och plocka försiktigt bort eventuella intorkade sårkrustor som är i vägen för stygnborttagningen.
- Lägg om med Jelonet och Solvaline/sårdyna.

Transplantatet blir mer hudfärgat för varje vecka som går.

Tagstället:

Ta också bort hudsuturerna på tagstället (lokal) efter vecka/veckor.

Fortsatta sårkontroller

Sårkontroller och omläggning rekommenderas 1 gång per vecka tills transplantatet läkt fast och har fin färg. Detta kan ta 3–4 veckor i normalfallet. När det läkt kan patienten själv fortsätta att tejpa transplantationsområdet med Micropore.

Komplikationer

Nekros

Om en del av transplantatet går i nekros kan denna del avlägsnas försiktigt med pincett och sax, alternativt sårslev. Patienten har sällan någon känsel i transplantatet varför detta brukar gå bra att göra utan bedövning. Om nekrosen sitter mycket hårt, låt det sitta kvar till nästa omläggningstillfälle.



Hypergranulation

Om hypergranulation uppstår inom del av transplantat som tidigare gått i nekros kan sårhälingen avstanna. Detta behandlas genom applicering av stark kortisonkräm (grupp IV eller III, t.ex. Dermovat eller Betnovat). Upprepa detta vid följande såromläggningar tills sårhälingen börjar gå åt rätt håll.



Kontakt

Vid frågor går det bra att kontakta oss på telefon **0720-78 76 24** eller **031-342 38 74**. Kan vi inte svara just då, lämna ett meddelande så ringer vi tillbaka.