

Njurmedicin Sahlgrenska
Avdelning 131

Framtagen av: Johanna Jigström Läkemedelsansvarig
sjuksköterska

Granskad av: Linda Afsenius

VEC Dialysmottagning Hem och självdialys

Godkänd av: Sigrídur Elíasdóttir VÖL

Stödjande dokument
2024-04-16

Provtagning ur CDK.

Provtagning ur en central dialyskateter får endast utföras av legitimerad sjuksköterska som har genomgått den fortbildning som krävs.

Material:

- Ett sterilt omlägnings set
- 3 st sterila kompresser
- Klorhexidinsprit 5%
- 4 st 10 ml spruta, luer-lock
- 2 st 20 ml spruta, luer-lock
- 6 st 10 ml ampuller NaCl 9%
- Antikoagulantia enl. ordinerat lås till skänklarna.
- Vacutainer med luer-lock
- Provrör + ett slaskrör
- Proppar, vita.
- Etiketter för markering
- Skyddsförkläde och undersökningshandskar.

Tillvägagångssätt:

1. Lägg patienten i planläge eller med sänkt huvudända
2. Arbeta aseptiskt, använd skyddsförkläde och rena undersökningshandskar.
3. Duka upp omlägningssetet och dränk de medföljande kompresserna och de extra kompresserna i klorhexidinsprit. Placera den medföljande duken under patientens CDK.
4. Rengör skänkel mekaniskt med klorhexidinsprit under minst 15 sekunder.
5. Låt lufttorka.
6. Avlägsna proppen på skänkel som proverna skall tas ur, lägg inte ner skänkel på duken.

7. Ta ny kompress med klorhexidinsprit och rengör gängorna på skänkeln mekaniskt i minst 15 sekunder.
8. Låt lufttorka.
9. Använd en 5 ml spruta för att aspirera ut kateterlåset. Fyll sprutan för att säkerställa att du verkligen fått med allt.
Stäng klämman.
10. Spola in 10 ml NaCl 9%, låt sprutan sitta kvar. Flusha skänkeln 10 gånger genom att dra kolven på sprutan fram och tillbaka. Detta är för att säkerställa utspädning i proverna.
Stäng klämman.
11. Koppla till en vaccutainer med luerlockfattning och ta proverna. Börja med ett slaskrör.
Stäng klämman.
12. Spola skänkeln med 20 ml NaCl 9 %.
Stäng klämman
13. Ett antikoagulantia-lås skall installeras i skänkeln. Ordination på vilket och hur mycket skall stå i dialysjournalen. Oftast används Citraflow 46,7% på patienter som dialyseras via Sahlgrenska.
Citraflow installeras enligt följande:
Spola in angiven mängd sakta (ca 8 sekunder). Biverkningar vid snabbare administration, så som domningar och obehagskänsla i gom och mun, är vanligt. Detta är snabbt övergående och ingenting patienten behöver oroa sig för.
Avsluta under övertryck / positivt avslut för att undvika proppbildning i kateterspetsen.
14. Sätt på den vita proppen.
15. Märk skänkeln med etikett markerad med "CDK" och även vilket lås som installerats i skänkeln.

OBS! Båda skänklarna skall alltid spolats och installeras med nytt lås vid hantering. Alltså:
Upprepa steg 4-15 (med undantag för själva provtagningen) i den andra skänkeln.