

Njurmedicin Sahlgrenska universitetssjukhuset

Avdelning 131

Framtagen av: Johanna Jigström Läkemedelsansvarig
sjuksköterska

Godkänd av: Sigrídur Elíasdóttir VÖL

Stödjande dokument

2024-01-25

Infusion/injektion av högdos furosemid 10 mg/ml.

Som patient med njursvikt kan mycket höga doser av intravenös behandling av furosemid förekomma. Följande dokument är utarbetat på avdelning 131 av läkemedelsansvarig sjuksköterska och godkänt av VÖL Sigrídur Elíasdóttir.

Eventuell hörselpåverkan som biverkan vid höga hastigheter är tagen i beaktning, dock kan risken anses som mycket liten i fall där njurfunktionen är låg.

Administrering via infusionspump:

Ordinerad mängd furosemid 10 mg/ml dras upp i ljusskyddad spruta. Behöver ej spädas ytterligare.

Infusionshastighet får inte överstiga 1000 mg/h.

Administrering som infusion:

Furosemid 10 mg/ml kan tillsättas i Natriumklorid 9mg/ml 100 ml på följande sätt:

- Töm ut ca hälften av NaCl 9mg/ml ur infusionsflaskan.
- Tillsätt ordinerad mängd furosemid 10 mg/ml.
- Administrera på ca 30 min via vanligt aggregat. Pump behöver ej användas.

Observera att Furosemid har en blodtrycksänkande effekt. Monitorering av blodtrycket kan vara indicerat.