

## Njuravd -checklista access inläggning eller revidering av avfistel avgraft

Patient ID
------------

Gäller för Vårdavdelning 131 giltig från 250225

Dagen före ingreppet	Datum	Sign.
Informera om ingreppet enligt rutin AV-fistel /AV-graft		
Lämna informationsbladet: Vård av AV-fistel efter kirurgi		
Blodprovstagnning dagen före operation HB, TPK, APTT, PK, Na K. Om patienten går i bloddialys kontrollera om detta är gjort på dialysmottagningen.		
Patienter som är predialys ta ovanstående prover men ta också fullständigt elstatus (NA, K, Ca, kreatinin, albumin och urea)		
Kontrollera att Blodgruppering finns i journalen		
Bastest på patienter som ska få överarmsfistel eller överarmsgraft		
EKG. Om patienten går i bloddialys kontrollera om detta är gjort på bloddialysen.		
Vid graftoperation. Kontrollera att patienten har dubbelduschat med descutan på morgonen före inläggning på avdelningen.  Om inte patienten duschat görs det på avdelningen.		
Operationsanmäld till kirurgoperation tlfnr: 28111 ( <i>Det görs av läkare vid akut operation, vid elektiv operation förs det av operationskoordinator</i> )		
Kontrollera ordinationer i orbit		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faxe hälsodeklaration till pre.-op fax 419247. Ring och hör om patienten behöver komma till pre-op tel 28521 eller om narkosbedömningen görs elektroniskt. <i>pre.-op center måndag- torsdag kl. 09.00-11.15, 13.00-15.00 och fredag kl. 09.00-11.15</i></li> <li>• Patienter som opereras i lokalbedövning, behöver inte gå till preop.</li> </ul>		
Sök ansvarig accesskir som märker patientens arm. Se till att venmappning finns i patientens pärm (ingen venmappning vid revision)		
Dubbeldusch med descutan på kvällen innan operation		
Svält från kl 24.00.		

<b>Operationsdagen</b>	<b>Datum</b>	<b>Sign.</b>
Kontrollera Pglukos ofta inför och under svält på diabetiker		
Blodprovstagning operationsdagens morgon kl 05.00 Na och K på patienter i dialys eller som har kaliumproblem.		
05.00 operationsdagens morgon koppla 500ml 5% glukos på patienter med diabetes typ 1		
Dubbeldusch med descutan på operationsdagensmorgon.		
Premedicinering enl ordination i orbit		
Preoperativ antibiotika eller enligt ordination till överarmsfistel och graft. Skickas med patienten till operation för att ges där.		
Kontrollera att patienten har id-band <i>obs ej på fistelarm</i>		
Patienten åker till operation i säng. Märk patientens säng med avd.nr och patientens namn		
Renbädda säng med draglakan och plast		
Patienten skall vara operationsklädd; skjorta och strumpor		
Smink och smycken avlägsnade		
Lås in patientens värdesaker i patientskåpet.		

<b>Efter operation</b>	<b>Datum</b>	<b>Sign.</b>
Patienten får äta och dricka		
Lyssna på AV-fisteln med stetoskop om det "svirrar"		
Kontroll av operationsförband		
Urinobservation		

<b>Information</b>	<b>Datum</b>	<b>Sign.</b>
Skicka med patienten ett stetoskop hem, instruera patienten hur det används och att det är lämpligt att lyssna på fisteln/graft morgon och kväll.		

<b>Samordning</b>	<b>Datum</b>	<b>Sign.</b>
Vid operation av AV-fistel på underarmen i lokalanestesi skrivs patienten rutinmässigt hem på operationsdagen.		
Vid operation av AV-fistel på överarmen eller graft stannar patienten kvar till dagen efter operation.		
Inspektera operationsförband och "svirr" vid hemgång		
Fistelkontroll görs efter 10-14 dagar på njurmottagningen eller patientens dialysmottagning. Tid bokas i läkarepikrisen.		