

# Postoperativ information

## AV-fistel alt AV-graft

### Nativ fistel alt Graft

Efter operation ska man lyssna/palpera AV/fistel alt AV/graft för att höra den ”svirra”. Hörs det ett svagt svirr, lyssna med doppler och informera läkare alternativt operatör. Inspektera förbandet vid spår av blod måla runt för att kunna utvärdera om det är en pågående blödning.

Viktigt att observera om armen svullnar, nedsatt känsel och temperaturskillnader i händerna.

Vid blödning ska förbandet i första hand förstärkas med ABS-dyna och tejp. Viktigt att fortsätta lyssna/palpera fistel för att kontrollera att den svirrar. Fortsätter det att blöda läggs armen i högläge och fortsatt observation att fistel svirrar.

Undvik i möjligaste mån att byta operationsförband pga. ökad infektionsrisk.

Fistlar får aldrig lindas utan ordination från operatör.

Instruera patienten hur han/hon lyssnar på fistel med stetoskop och att det ska göras hemma dagligen.

### Nedläggning AV-fistel alt AV-graft

Den opererade armen ska vara lindad i 4 veckor efter operationen enligt ordination. Ta reda på om patienten kan linda om armen själv vid behov eller ordna tid hos respektive njurmottagning om lindad skulle falla av eller behöva bytas. Lindan får endast tas bort vid dusch.