

Doknr. I Barium  
30726

Dokumentserie  
su/med

Giltigt fr o m  
2022-02-03

Version  
3

# RUTIN

## PD-Patientinstruktion Desinfektion av huden runt PD-kateterutgång

**Innehållsansvarig:** Marie Blomén, Sjuksköterska, PD-mottagning (marbl24)  
**Godkänd av:** Jennie Lönnbro Widgren, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (jenlo4)  
**Denna rutin gäller för:** Mottagning för Dialys i hemmet (PD) vid Njurmedicin SU

### Bricka

Ytdesinfektion 70 + till brickan

Klorhexidinsprit, till magen

Handdesinfektion till händerna

Kompresser

Förband

Tejp

Desinfektionen  
ska göras  
3 gånger i veckan

Byt alltid förband  
efter dusch eller om  
förbandet blivit  
vått av någon annan  
anledning

**Tvätta brickan med  
ytdesinfektion.**

**Lägg upp minst 5 kompresser,  
med pincett på brickan.**

**Dränk in kompresserna med  
Klorhexidinsprit 5 mg/ml.**

**Öppna förpackningen till  
förbandet och lägg förbandet  
på brickan.**

**Klipp en remsa av tejp  
och sätt på kanten på brickan.**



# RUTIN

## PD-Patientinstruktion Desinfektion av huden runt PD-kateterutgång

**1.**  
**Desinfektera händerna.**



**2.**  
**Ta bort det gamla förbandet utan att dra i katetern.  
Inspektera förbandet**



**3.**  
**Inspektera kateterutgången!**




**Fin kateterutgång**

**Rodnad  
kateterutgång.**

**4.**  
**Desinfektera händerna.**



**5.**  
**Tvätta huden med en kompress i 30 sekunder i vardera riktningen.  
Tvätta sedan slangen inifrån och ut.**



**6.**  
**Låt torka. Tejpa katetern i en mjuk böj ca 5 cm från utgången.**



**7.**  
**Sätt på förbandet och fixera katetern i bälte eller motsvarande**

