

Prover får signeras av barnmorska på SpecMVC och MGN

- Normala screeningprover
- Normala anemiprover
- Negativ MRB
- KUB prover
- Normalt TSH hos icke-Levaxinbehandlad patient
- Normalt TSH hos patient som blivit insatt på Levaxin under graviditeten. Handläggs enl Riktlinje Tyroideasjukdom under och efter graviditet
- Negativ urinodling
- Negativt klamydia- och gonorrétest
- Normala toxprover, vid symptomfri patient och då läkardokumenterad vårdplan finns.
- Normala TPK, PK(INR) och APTT tagna inför insättning av Fragmin
- Normalt TPK taget 2 v efter insättning av Fragmin eller i v 34.
- Normala gallsyror, om inte värdet tidigare varit förhöjt
- Negativt Hepatit C, taget efter konstaterad ICP
- Svaret ”Gränsvärde” (GRZ) på rubellaantikroppar. I detta fall skrivs en patientnotering om att patienten ska erbjudas vaccination på BB.
- Ferritin < 1000µg/L. Handläggs enligt Riktlinje Järntillskott under graviditet
- Alla PNA-prover som bm bedömt och åtgärdat

Prover som får signeras av diabetessköterska eller barnmorska vid diabetesrond där läkare sambedömer proverna:

Förutsättningar:

- **Normala prover signeras** (om ny plan för nästa provtagning ska göras dokumenteras den av den som signerar)
- **Avvikande prover ska ha en journalanteckning där det framgår vilken läkare som varit på rondens och hur proverna åtgärdas.**
- HbA1C
- Thyroideaprover
- Elstatus (Na, K, Ca, krea)
- GFR
- Inohexolclearance
- Blodketoner
- TSH och T4, T3
- TPO-antikroppar
- Urinketoner
- Urinsticka
- U-albumin/kreakvot
- S-holotranskobalamin
- GAD-antikroppar
- C-peptid
- s-insulin
- P-glukos
- IA2-antikroppar