



ESEC plan för typ 1 diabetes – Tandem

Förlossningsplan vid planerat kejsarsnitt (ESEC) vid Tandempump gällande insulindoser, glukosdropp samt blodsockerkontroller, vid typ 1 diabetes

10% glukosdropp kopplas direkt på morgonen med 125ml/timme.

1L RingerAcetat kopplas utan droppräknare direkt på morgonen.

Patienten lägger in 35 gram kolhydrater, plus CGM värdet i pumpen när man kopplat glukosdroppet och ger föreslagen dos, ca ____E. Upprepas varje till varannan timme v.b.

Mät kapillärt blodsocker efter 1 timme.

Viktigt bryta fastan med insulin, energi och vätska för att få ett stabilt blodsocker och inte bilda ketoner.

Insulinbehandling/blodsockermätning:

Toujeo ____E på op dagens morgon. Nollas post partum

Insulin ____i Tandem t:slim X2 pump med integrerad CGM. Sensorvärden kan följas i pumpens display. Sensorväret är inte alltid tillförlitligt mät därför kapillärt p-glukos varje halvtimme.

Målsättning för blodsockret > 4 mmol/l och <7 mmol/l

CGM varningar under op: lågt 4,0 mmol/l, högt 7,0 mmol/l för att få varningar i tid om ev åtgärder.

Infusionset placering i överarm.

Kvinnan skall också ha plan på reservbehandling med insulinpenna:

Basinsulin ____E. Måltidsinsulin ____E.

Om CGM värdet sjunker < 4,0 mmol/l öka dropptakten 1000ml/timme i 1 minut, mät kapillärt p-glukos, upprepas varje minut tills blodsockret >4,2mmol/l. Återgå till 125ml/timme. Detta sköts av narkospersonalen.

Om CGM värdet stiger >7,0 mmol/l, lägg in 10g kolhydrater i pumpen och ge föreslagen dos med pumpen, detta sköts av partner/patient.

Så fort placentan är ute, öka glukosdroppet till 200-300ml/h. Blodsockermål 5-12mmol/l.

Låt glukosdroppet fortgå tills patienten kan försörja sig helt per os. Koppla nytt v.b

Partner/patient aktiverar CIQ och går över på lägre basalprogram med högre kvoter.

Post op:

Toujeo nollas

Låt glukosdroppet fortgå tills patienten kan försörja sig helt per os. Lägg in 35 gram kolhydrater i pumpen v.b, om CGM värdet > 12 mmol/l

Öka droptakt om CGM värdet sjunker < 4,2 mmol/l, och kontrollera enl. ovan.

Ändra CGM varningar i app, dag lågt: 4,5, högt 14 mmol/l, natt lågt: 4,1, högt 14 mmol/l

Om endast CGM i pump, lågt 4,2, högt 14mmol/l

BB:

Se till att det finns ät/drickbart inne på rummet, även nattetid.

Behöver äta/dricka vid varje amningstillfälle

Kost: Beställa mat från patientmatsedeln, själv få välja

Lägg endast in kolhydrater till fyra huvudmål, frukost, lunch, middag och kvällsmat.

Mellanmål korrigerar pumpen automatiskt

Epikriskopia skickas till ordinarie Diabetesmottagning