

Provtagning av klamydia/gonorré samt smittspårning/ behandling vid positivt provsvar inom obstetriken

Handläggning avseende klamydia, gonorré och mykoplasma för verksamhet BMM/gynekologi beskrivs i följande riktlinje: [Klamydia, gonorre, mycoplasma, barnmorskemottagningar, VGR.pdf](#)

Detta dokument avser att beskriva hur provtagning samt hantering av positivt provsvar ska handläggas inom obstetriken. Provtagning avseende mycoplasma beskrivs ej i detta dokument.

Rutin för provtagning

Provtagning för klamydia/gonorré bör erbjuds frikostigt vid symtom och vid sexuella kontakter som föranleder oro hos patient eller vårdgivare. Sexualanamnes tas före provtagning. Ingen som önskar provtagning bör nekas.

Analys för klamydia och gonorré utförs med Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) och besvaras alltid tillsammans. Provrör beställs via marknadsplatsen eller MIV (Aptima Multitest Swab).

Vaginalprov eller cervixprov rekommenderas för diagnostik av klamydia och gonorré hos kvinnor. Vaginalprov kan tas av patienten själv eller av vårdgivare. Urinprov rekommenderas inte som ensamt prov, men kan erbjudas om patienter varken vill ta vaginalprov själv eller gynundersökas.

Provet analyseras via SÄS. I ROSP väljs mottagare "Klinisk mikrobiologi SÄS". Provet skickas enligt ordinarie transportrutin.

Provtagningshänvisningar beskrivs här:

[Chlamydia trachomatis/neisseria gonorrhoeae \(PCR\) - Södra Älvsborgs Sjukhus](#)

Vid positivt prov för Klamydia eller Gonorré

Vid positivt prov för klamydia kontaktas abortmottagningen för hjälp med smittspårning samt anmälan i SmiNet. Aktuell behandling ordineras av läkare inom obstetrike. För patienter som är inskrivna på specialistmödravården läggs provsvar till konsultläkare för snabbt omhändertagande.

Kontrollprov för klamydia tas endast på gravida, 4-5 veckor efter avslutad behandling. Det finns risk för falskt positivt prov om det tas tidigare. Kontrollodling får planeras och ombesörjas av den mottagning den gravida tillhör. Läkare inom obstetrike som hanterar positivt provsvar och sätter in behandling ombesörjer att journalkopia skickas till den gravidas ordinarie mottagning för uppföljning.

Vid positivt svar för gonorré kontaktas venereolog för utredning, behandling och smittspårning.