

# Klavikelfraktur -små barn

## Bakgrund

Nyckelbenet är ett svagt S-format ben som sitter mellan bröstbenet och ett utskott på skulderbladet. Det är ganska vanligt med frakturer här efter fall mot axeln hos mindre barn.

## Symptom

Vanligtvis blir barnet ordentligt ledset i samband med att hen ramlat. Ibland kan man se en liten svullnad över nyckelbenet. I vissa fall märker man bara av en fraktur genom att barnet inte vill använda samma sidas arm normalt. När barnet sitter eller ligger stilla brukar det inte göra så ont men om man t ex försöker lyfta barnet eller klämmer över nyckelbenet så gör det ont.

## Undersökning

I de allra flesta fall räcker det med en noggrann manuell undersökning av barnet för att man ska kunna vara säker på diagnosen. Om man inte riktigt vet vad som hänt eller om man inte kan vara säker på diagnosen så gör man en röntgenundersökning men det behövs mycket sällan.

## Behandling

Första dagarna bör man ge barnet vanliga smärtstillande medicin. Man behöver också vara försiktig när man hanterat barnet för att det ej ska få ont. Det kan inte hända något i frakturen av vanlig skötsel av barnet. För lite större barn kan man använda en mitella när barnet ska vara uppe och röra sig.

## Prognos

Nyckelbensfrakturer läker oftast ganska fort. Smärtan brukar bli bättre på kort tid. När den läker utvecklas ofta en liten knöl där frakturen suttit, den försvinner sedan över tid, kan synas i upp mot ett halvår.

**Akutmottagning barn**