

# Smärtlindring i hemmet

Ert barn kommer eventuellt att behöva smärtlindring i form av paracetamol (PANODIL/ALVEDON). För att undvika smärtgenombrott rekommenderar vi att ni ger smärtlindring de närmaste dagarna. Om behov finns, går det bra att ge barnet den högre doseringen (se nedan) i tre dygn. Om barnet efter tre dygn fortfarande behöver smärtlindring, övergå då till den rekommenderade dosen på förpackningen.

Panodil/Alvedon (paracetamol), form och styrka:.....

Dosering:.....var.....timme, max 3-4 ggr/dygn

Kan ges from.....tom.....

Senast givna dos på avdelningen klockan:.....

Ovanstående dosering gäller endast vid detta vårdtillfälle.

Underskrift ansvarig läkare.....

Namnförtydligande.....

Om ert barn behöver starkare medicin än paracetamol (Alvedon/Panodil) rekommenderar vi VOLTAREN/DIKLOFENAK eller IPREN/BRUFEN som kan skickas med hem från avdelningen för två dygn. Om behovet är längre kan läkaren skriva recept.

Läkemedel namn, form och styrka:.....

Dosering.....var.....timme, max .....ggr/dygn

Senast givna dos på avdelningen klockan:.....

Underskrift ansvarig läkare.....

Namnförtydligande.....

## Akutmottagning barn



SAHLGRENSKA  
UNIVERSITETSSJUKHUSET  
VGR

Skriven av Anna Vedin, sjuksköterska  
Granskad av Johanna Röntfors, överläkare  
Giltigt från och med 20260114