

Mina frågor och funderingar

Granskat av: Pia Löfgren
Reviderad: 2025-10-28

Verksamhetsområde
Kirurgi barn
Drottning Silvias barnsjukhus




Brusten blindtarm

Information till föräldrar och barn

Vad är blindtarmsinflammation?

Blindtarmsinflammation är en av de vanligaste orsakerna till operation i buken hos barn. Ungefär en femtedel av barn med inflammerad blindtarm har denna vid upptäckten brustit och infektionen kan därmed ha spridits i magen (buken). Ofta samlas det var i bukhålans nedre del, i lilla bäckenet. Du/Ditt barn har genomgått en operation (öppet eller med titthål) där blindtarmen tagits bort. Barnet kommer att ha ont i magen och såren några dagar efter operationen. Om titthålsoperation är gjord kan man också ha ont i axlarna de första dagarna. Bukmuskulaturen och huden är sydd med tråd som försvinner av sig själv och har kompletterats med tape och täckande förband. Antibiotika mot infektionen har givits under vårdtiden direkt in i blodbanan och kompletteras ibland med ytterligare några dagars behandling efter utskrivning i form av tabletter eller mixtur.



Skötsel

Operationsförbandet skall sitta kvar i 7-10 dagar, dock längst 14 dagar efter operationsdatum.

Det går bra att duscha med förbandet. Vänta med bad i badkar eller bassäng tills efter planerat återbesök.

Du/Ditt barn skall avstå från fysisk aktivitet (t ex fotboll, skolgymnastik, cykling, ridning) i 3 veckor, om läkare inte sagt något annat.

Kostråd: Skonsam kost tills dess att avföringen normaliserats, därefter normal kost. Inget återbesök planeras, men kontakta oss om:

- Om barnet får feber
- Om operationsområdet blir rött eller svullet
- Vätska från operationsområdet
- Om smärtan i magen återkommer eller tillkomst av kräkningar
- Om ditt barn har täta urinträngningar eller smärta vid kissning

Kontakta i så fall 1177 för hänvisning.