För mer information eller vid problem kontakta:

Nutritionssjuksköterska _____

Tel. _____

Avdelning _____

Tel._____

Mina frågor och funderingar

Skrivet av: Malin Leidzén, barnsjuksköterska
Frida Kjellberg, barnsjuksköterska
Granskat av: Zsuzsa Bartik, barnkirurg
Reviderad: 2025-01-13

Verksamhetsområde
Kirurgi barn
Drottning Silvias barnsjukhus

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET VGR



Behandling av granulom

Information till barn och föräldrar

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET VGR

Granulom

Granulom är en mjuk, fuktig, rosa- eller rödfärgad svullnad, storleken är kring 3–10 millimeter. Granulom vätskar och kan vara lättblödande, vilket är ofarligt. Vanligtvis luktar det inget. Eftersom det inte finns nervceller i granulomet orsakar det vanligtvis inte smärta

Behandling

Granulom behandlas i första hand med kortisonkräm eller droppar enligt ett schema. I andra hand används silvernitrat som man lapiserar med. I sista hand används kirurgisk åtgärd.

1. Eloconkräm 0,1% eller Betnovat
   Elocondroppar, Dexafree

2. Lapis (silvernitrat)

3. Kirurgisk behandling

☐ **Behandling av granulom med kortisonkräm grupp 3**

1g/dag i 7 dagar __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__

1 g/dag varannan dag i 2 dagar ___/___ ___/___

1 g/dag var tredje dag i 2 dagar ___/___ ___/___

Total behandlingstid 21 dagar

- Tvätta dagligen med tvål och vatten.
- Skydda huden runt stomat med hudbarriär eller fet salva t.ex vaselin eller Cavilon
- Lägg en kompress runt knappen och ta kräm med en bomullspinne och lägg en ”klick” under kompressen på granulomet. Underhållsbehandla vid behov med kräm 1-2g/vecka

☐ **Behandling av granulom med kortisondroppar grupp 3**

1g/dag i 7 dagar __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__

- Tvätta dagligen med tvål och vatten
- Skydda huden runt stomat med hudbarriär eller fet salva t.ex Vaselin eller Cavilon
- Droppa 3 droppar 2 ggr/dag i 7 dagar i stomat
- Behandlingen kan upprepas direkt ytterligare 7 dagar efter kontakt med ansvarig sjuksköterska

Underhållsbehandla vid behov med 3 droppar 1 - 2 ggr/vecka.

☐ **Lapisering**

1g/dag följande dagar ___/___ ___/___ ___/___ ___/___

- Bedöva huden med Xylocaingel ca 5 minuter innan behandling.
- Skydda den friska huden med hudbarriär, tex Cavilon.
- Tryck (dutta) Silvernitratpinnen mot granulomet, inifrån och ut.
- Täck området med en kompress till exempel SkinX
- Behandla var annan till var tredje dag, ca 3-4 tillfällen.
- Eloconsalva kan med fördel läggas på efter behandling.

Annat att tänka på vid granulom

- ✓ Kontrollera knappens längd
- ✓ Effekten kan förstärkas genom ett ökat tryck mot granulomet, lägg kompresser under knappen för att öka trycket.
- ✓ Ta bort matslangen mellan måltiderna för att förhindra mekanisk retning
- ✓ Genomför hela behandlingschemat.
- ✓ Längre behandlingstid kan vara nödvändigt.
- ✓ Om barnet ska sövas för något annat informera vården för att ev. avlägsna granulomet kirurgiskt
- ✓ Salva för hemorrojder kan hjälpa.