

Doknr. i Barium [dokumentnr]	Dokumentserie [dokumentserie]	Giltigt fr o m [giltigt fr o m]	Version [version]
<b>RUTIN</b> Kontinuerlig Klonidinfusion 15 mikrogram/ml			
<b>Innehållsansvarig:</b> Karin Ölander <b>Godkänd av:</b> Linus Jönsson <b>Denna rutin gäller för:</b> Kirurgiavdelning Barn			

## Syfte

Att säkerställa övervakning på patienter med kontinuerlig Klonidinfusion 15 mikrogram/ml på kirurgiavdelning barn.

## Arbetsbeskrivning

Klonidin har lätt analgetisk och sederande effekt samt potentierar effekten av andra analgetika t ex opioider och möjliggör därmed dosreduktion av dessa. Vid övertag av patienter från BIVA eller neonatalavdelning kan kontinuerlig infusion av Klonidin fortsätta om övervakning sker. Likaså kan klonidinfusion ordinerar på ineliggande patienter för att uppnå optimal smärtlindring.

- Patient som erhåller klonidinfusion skall kontinuerligt övervakas med pox och vara uppkopplade via avdelningens övervakningssystem.
- Övriga kontroller som blodtryck, puls och andningsfrekvens,tas och registreras var tredje timme.

Dosering sker utifrån e-Ped [Se här](#) .

Dosering för barn < 10 kg 0,5 mikrogram/kg/timme.

Dosering för barn > 10 kg 1 mikrogram/kg/timme.

Färdigspädd Klonidin 15 mikrogram/ml används alltid på kirurgiavdelning barn.

## Ansvar

Verksamhetschef har det övergripande ansvaret. Avdelningschef och avdelningsöverläkare ansvarar för att rutinen är känd och följs på enheten. Sjuksköterska har egenansvar att följa rutin.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient.” Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

## Relaterad information

E-Ped

## Dokumentation

Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

## Granskare/arbetsgrupp

Karin Ölander  
Jeanette Karlsson  
Malin Leidzén  
Sofia Wiberg