

Datum: 2020-02-06

Rev:1  
Granskat, Christina Goldkuhl**Medtag alltid denna blankett till provtagning och besök.**

Kapslar Temozolomid ska sväljas hela med vatten i sittande ställning, gärna på kvällen. Fasta en timme före och efter intag. Antimetika Zofran/Ondansetron vid behov.

Inför Rituximab tas Alvedon, Ceterizin, Betapred enligt ordination strax innan du åker hemifrån.

**Bilaga 2****Behandlingsplan: Palliativ behandling Temozolomid/ Rituximab vid primärt CNS-Lymfom**

Kur 1: Rituximab iv + Temozolomid kapsel		Datum	Tid	Plats
Provtagning 1-2 dagar innan	Hb, LPK, TPK, neutrofila, el-, leverstatus, vikt			
Läkarbesök				
<b>Behandling</b>				
Provtagning efter 1 vecka	Hb, LPK, TPK, neutrofila			

Kur 2 (dag 15): Rituximab iv + Temozolomid kapsel		Datum	Tid	Plats
Provtagning dag 14	Hb, LPK, TPK, neutrofila, el-, leverstatus, vikt			
Läkarbesök				
<b>Behandling</b>				
Provtagning efter 1 vecka	Hb, LPK, TPK, neutrofila			
	Hb, LPK, TPK, neutrofila			

Kur 3: Rituximab iv		Datum	Tid	Plats
Provtagning 1-2 dagar innan	Hb, LPK, TPK, neutrofila, el-, leverstatus, vikt			
<b>Behandling</b>				
Provtagning	Hb, LPK, TPK, neutrofila			
	Hb, LPK, TPK, neutrofila			

Provtagning och läkarbesök inför strålbehandling		Datum	Tid	Plats
Provtagning	Hb, LPK, TPK, neutrofila, el-, leverstatus, vikt			
Läkarbesök				
<b>Strålbehandling</b>				

Dagligen under strålbehandling tas Temozolomid kapsel				
Provtagning veckovis	Hb, LPK, TPK, neutrofila, leverstatus, vikt, elstatus vid behov			
	Hb, LPK, TPK, neutrofila, leverstatus, vikt, elstatus vid behov			
	Hb, LPK, TPK, neutrofila, leverstatus, vikt, elstatus vid behov			
	Hb, LPK, TPK, neutrofila, leverstatus, vikt, elstatus vid behov			

Provtagning och läkarbesök ca 14 dagar efter avslutad strålbehandling. Bedömning inför underhållsbehandling				
Provtagning	Hb, LPK, TPK, neutrofila, el-, leverstatus, vikt			
Läkarbesök				