

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sektionen för hematologi och koagulation

PATIENTINFORMATION

Högdosmetotrexat

Patientinformation Högdosmetotrexat

INFÖR INLÄGGING PÅ AVD 141 FÖR HÖGDOS METOTREXAT-BEHANDLING

Under vårdtiden ska du behandlas med en hög dos av ett läkemedel som heter Metotrexat.

För att förbättra dina förutsättningar inför behandlingen och för att förhindra att dina njurar ska ta skada av behandlingen är det viktigt att du dagen innan inläggningen börjar dricka rikligt, helst 2-3 liter vätska (men inte juice, saft eller coca-cola som är sura drycker).

Du ska heller INTE ta följande mediciner från och med dagen innan inläggning:

- Bactrim, Eusaprim, Aciclovir, Trombyl, Ciprofloxacin
- protonpumpshämmare för magen av typ omeprazol (pantoprazol, Losec)
- smärtstillande av typen NSAID (t.ex Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen),
- blodtrycks/hjärtsviktsläkemedel av typen ACE/ARB-hämmare (tex Enalapril, Ramipril, Candesartan, Losartan Valsartan, Irbesartan).

Är du tveksam avseende att pausa dessa mediciner (eller är osäker om din medicin hör till dessa), hör av dig till oss så kan vi bedöma om du ska använda dem eller inte.

Hör även av dig om du använder Fenytoin, Valaciclovir, Penicillin, andra antibiotika eller epilepsiläkemedel.

Om du samtidigt med HÖGDOS METOTREXAT ska få behandling in i ryggmärgsvätskan (vilket ofta är fallet för patient med akut lymfatisk leukemi) så ska du heller INTE ta blodtunnande mediciner från och med kvällen innan inläggning såsom Fragmin, Innohep, Klexane, Waran, Xarelto, Eliquis, Lixiana, Pradaxa, Trombyl.

Tag gärna med en aktuell läkemedelslista vid inläggning på avdelningen.