Innehållsansvarig: Katarina Olsson Lundberg, Specialsjuksköt, Hematologimottagning Sahlgrenska (katol12); Jan-Erik Johansson, Universitetssjukhusö, Läkare Hematologi (janjo26)
Godkänd av: Lars Möllgård, Sektionschef
Denna rutin gäller för: Verksamhet Specialistmedicin

OBS!
Ge Uromitexan®/mesna enligt PM-ordination

2 g/m²: mesna på timme -30min, +1, +3, +6 och +9
4g/m²: mesna på timme -30min, +1, +3, +6, +9 och +18

Patient-id:

Kontroller i samband med högdos 2 g/m² eller 4 g/m² cyklofosfamid (Cy)

Datum: _____			**Datum:** _____		
Kl. 12	EKG		**Kl. 00**	Blodtryck	
	Blodtryck			Puls	
	Puls			POX	
	POX			ev. Vikt	
	Vikt			Urinmätning	Extra furosemid ges vid diures <1500 mL
	Na				
	K				
	Kreatinin				
	Urinmätning*	Extra furosemid ges vid diures <1500 mL			
Kl. 18	Blodtryck		**Kl. 06**	Blodtryck	
	Puls			Puls	
	POX			POX	
	Vikt			Vikt	
	Urinmätning	Extra furosemid ges vid diures <1500 mL		Urinmätning	Extra furosemid ges vid diures <1500 mL
	Na			Na	
	K			K	
	Kreatinin			Kreatinin	

*Från dag 2 om behandling ges i flera dagar.