

| | | | |
|--------|--|-------------------------------------|---------|
| Datum: | | Antal sidor, (inklusive denna sida) | FAX-nr: |
| Till: | | | |

| | | |
|--|----------------------------|---|
| Från: | Leg Ssk, CAR-T-koordinator | FAX-nr: 031-82 57 36. Tel: 031-342 7370 |
| Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska universitetssjukhuset. | | |

D1 Bilaga 1 Utredning inför CAR-T-cellsinfusion

Patient:

Personnr:

Inläggning:

Behandlingsstart:

Infusionsdatum:

Utredningsresultat via regional journal *alt* fax senast:

Enligt ikryssade rutor nedan:

Medicinsk epikris från senaste vårdtillfället/sammanfattande anteckning (inkl ev aktiv infektion, autoimmun sjuk?)
 Aktuell medicinlista (systemisk behandling med steroider/övr immunhämmande? antikoagulantia)
 Tandläkarbedömning (remiss skickad av CAR-T-koordinator)

Kontrollera att organscreening (UCG, iohexolclearance, spirometri) är utförd inför leukaferes. Upprepas endast vid behov som vid nytillkomna symptom

Max 1 mån gammalt vid konditioneringsstart:

Längd och vikt
 CT thorax och ansikte
 HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc, Anti-HCV, HTLV I+II, anti HIV 1 och 2, syfilisantikroppar
 S-Elfores
 S-kortisol (med angiven provtagningstid)
 Ferritin
 Cystatin-C
 NTproBNP

Inom ca 2 veckor före konditioneringsstart:

Enligt PAL:s bedömning: Remissionsbedömning (CR, CRu, PR, VGPR, stabil eller progressiv sjukdom, inkl MRD om aktuellt), tumörvolym och s-LD ska anges i journal.
 Enligt PAL:s bedömning: Lumbalpunktion, MR, benmärg och/eller annan undersökning när detta krävs för remissionsbedömning.
 Performance status enligt ECOG. Anges i journal.

Max 2 veckor gammalt vid konditioneringsstart:

EKG
 Hb, LPK, TPK, Diff
 Na, K, jon Ca, Kreat, ASAT, ALAT, ALP, Bil, Prot
 P-glucos
 S-LD
 APTT och PK
 CRP och SR
 Svampodling: urin, feces, svalg eller insida kind
 VRE och ESBL i feces

Max 1 vecka gammalt vid konditioneringsstart:

Graviditetstest (kvinnor <52 år)

rev 2 240126

www.sahlgrenska.se