









<p style="text-align: center;">Bleomycinkort</p> <p>Din behandling gavs t.o.m.</p> <p style="text-align: center;">SEKTIONEN FÖR HEMATOLOGI OCH KOAGULATION </p>	<p style="text-align: center;">Bleomycinkort</p> <p>Din behandling gavs t.o.m.</p> <p style="text-align: center;">SEKTIONEN FÖR HEMATOLOGI OCH KOAGULATION </p>
<p style="text-align: center;">Bleomycinkort</p> <p>Din behandling gavs t.o.m.</p> <p style="text-align: center;">SEKTIONEN FÖR HEMATOLOGI OCH KOAGULATION </p>	<p style="text-align: center;">Bleomycinkort</p> <p>Din behandling gavs t.o.m.</p> <p style="text-align: center;">SEKTIONEN FÖR HEMATOLOGI OCH KOAGULATION </p>
<p style="text-align: center;">Bleomycinkort</p> <p>Din behandling gavs t.o.m.</p> <p style="text-align: center;">SEKTIONEN FÖR HEMATOLOGI OCH KOAGULATION </p>	<p style="text-align: center;">Bleomycinkort</p> <p>Din behandling gavs t.o.m.</p> <p style="text-align: center;">SEKTIONEN FÖR HEMATOLOGI OCH KOAGULATION </p>
<p style="text-align: center;">Bleomycinkort</p> <p>Din behandling gavs t.o.m.</p> <p style="text-align: center;">SEKTIONEN FÖR HEMATOLOGI OCH KOAGULATION </p>	<p style="text-align: center;">Bleomycinkort</p> <p>Din behandling gavs t.o.m.</p> <p style="text-align: center;">SEKTIONEN FÖR HEMATOLOGI OCH KOAGULATION </p>

<p>Du har under din tumörbehandling erhållit ett läkemedel som heter BLEOMYCIN.</p> <p>Detta kan, speciellt i kombination med syrgas, ge ökad risk för lungbiverkningar</p> <p>Försiktighet med syrgastillförsel rekommenderas därför under behandlingen och upp till ca 5 år efter avslutad behandling.</p> <p>Om du trots allt är i behov av syrgas skall du alltid erhålla detta, men lägsta möjliga syrgaskoncentration rekommenderas.</p> <p>Före ev. sövning är det viktigt att du informerar narkosläkare om ovanstående</p> <p>Djuphavsdykning rekommenderas inte heller under denna period.</p>	<p>Du har under din tumörbehandling erhållit ett läkemedel som heter BLEOMYCIN.</p> <p>Detta kan, speciellt i kombination med syrgas, ge ökad risk för lungbiverkningar</p> <p>Försiktighet med syrgastillförsel rekommenderas därför under behandlingen och upp till ca 5 år efter avslutad behandling.</p> <p>Om du trots allt är i behov av syrgas skall du alltid erhålla detta, men lägsta möjliga syrgaskoncentration rekommenderas.</p> <p>Före ev. sövning är det viktigt att du informerar narkosläkare om ovanstående</p> <p>Djuphavsdykning rekommenderas inte heller under denna period.</p>
<p>Du har under din tumörbehandling erhållit ett läkemedel som heter BLEOMYCIN.</p> <p>Detta kan, speciellt i kombination med syrgas, ge ökad risk för lungbiverkningar</p> <p>Försiktighet med syrgastillförsel rekommenderas därför under behandlingen och upp till ca 5 år efter avslutad behandling.</p> <p>Om du trots allt är i behov av syrgas skall du alltid erhålla detta, men lägsta möjliga syrgaskoncentration rekommenderas.</p> <p>Före ev. sövning är det viktigt att du informerar narkosläkare om ovanstående</p> <p>Djuphavsdykning rekommenderas inte heller under denna period.</p>	<p>Du har under din tumörbehandling erhållit ett läkemedel som heter BLEOMYCIN.</p> <p>Detta kan, speciellt i kombination med syrgas, ge ökad risk för lungbiverkningar</p> <p>Försiktighet med syrgastillförsel rekommenderas därför under behandlingen och upp till ca 5 år efter avslutad behandling.</p> <p>Om du trots allt är i behov av syrgas skall du alltid erhålla detta, men lägsta möjliga syrgaskoncentration rekommenderas.</p> <p>Före ev. sövning är det viktigt att du informerar narkosläkare om ovanstående</p> <p>Djuphavsdykning rekommenderas inte heller under denna period.</p>
<p>Du har under din tumörbehandling erhållit ett läkemedel som heter BLEOMYCIN.</p> <p>Detta kan, speciellt i kombination med syrgas, ge ökad risk för lungbiverkningar</p> <p>Försiktighet med syrgastillförsel rekommenderas därför under behandlingen och upp till ca 5 år efter avslutad behandling.</p> <p>Om du trots allt är i behov av syrgas skall du alltid erhålla detta, men lägsta möjliga syrgaskoncentration rekommenderas.</p> <p>Före ev. sövning är det viktigt att du informerar narkosläkare om ovanstående</p> <p>Djuphavsdykning rekommenderas inte heller under denna period.</p>	<p>Du har under din tumörbehandling erhållit ett läkemedel som heter BLEOMYCIN.</p> <p>Detta kan, speciellt i kombination med syrgas, ge ökad risk för lungbiverkningar</p> <p>Försiktighet med syrgastillförsel rekommenderas därför under behandlingen och upp till ca 5 år efter avslutad behandling.</p> <p>Om du trots allt är i behov av syrgas skall du alltid erhålla detta, men lägsta möjliga syrgaskoncentration rekommenderas.</p> <p>Före ev. sövning är det viktigt att du informerar narkosläkare om ovanstående</p> <p>Djuphavsdykning rekommenderas inte heller under denna period.</p>
<p>Du har under din tumörbehandling erhållit ett läkemedel som heter BLEOMYCIN.</p> <p>Detta kan, speciellt i kombination med syrgas, ge ökad risk för lungbiverkningar</p> <p>Försiktighet med syrgastillförsel rekommenderas därför under behandlingen och upp till ca 5 år efter avslutad behandling.</p> <p>Om du trots allt är i behov av syrgas skall du alltid erhålla detta, men lägsta möjliga syrgaskoncentration rekommenderas.</p> <p>Före ev. sövning är det viktigt att du informerar narkosläkare om ovanstående</p> <p>Djuphavsdykning rekommenderas inte heller under denna period.</p>	<p>Du har under din tumörbehandling erhållit ett läkemedel som heter BLEOMYCIN.</p> <p>Detta kan, speciellt i kombination med syrgas, ge ökad risk för lungbiverkningar</p> <p>Försiktighet med syrgastillförsel rekommenderas därför under behandlingen och upp till ca 5 år efter avslutad behandling.</p> <p>Om du trots allt är i behov av syrgas skall du alltid erhålla detta, men lägsta möjliga syrgaskoncentration rekommenderas.</p> <p>Före ev. sövning är det viktigt att du informerar narkosläkare om ovanstående</p> <p>Djuphavsdykning rekommenderas inte heller under denna period.</p>