

Senast reviderat: 2025-11-01 rev 6

Dokumentet gäller för: Sektionen för Hematologi och Koagulation

Innehållsansvarig: Petra Lindroos Kölqvist, Leg. sjuksköterska

Godkänd av: Martin Stenson, Sektionschef

Humant plasmaprotein- OctaplasLG®

Revideringar i denna version

- Allmän översyn av dokumentet.
- Ändrade förberedelser angående beställningsförfarande.
- Dokumentation som rubrik är tillagd.

Revisionshistoria

Rev	Giltig från	Förändring	Författare
5	20-08-10	<ul style="list-style-type: none">• Allmän översyn av dokumentet• Vissa språkliga förändringar• Ändrad hållbarhetstid.• Tillägg om att patienten ska observeras 20 min efter transfusion	Petra Lindroos Kölqvist
4	2017-06	<ul style="list-style-type: none">• Ny beställningsrutin samt återrapportering i InterInfo.	Petra Lindroos Kölqvist
3	2017-01	<ul style="list-style-type: none">• Översyn av dokumentet.• Mindre språkliga förändringar gjorda	Petra Lindroos Kölqvist
2	2013-07	<ul style="list-style-type: none">• Översyn av dokumentet.• Mindre språkliga förändringar gjorda	Petra Lindroos Kölqvist
1.1	2012-01	<ul style="list-style-type: none">• Översyn av dokumentet.• Mindre språkliga förändringar gjorda	Petra Lindroos Kölqvist
1.1	2010-04	<ul style="list-style-type: none">• Titelbyte från Octaplas till Humant plasmaprotein/Octaplas®• Behandlingsplanen ska innehålla ordination.• Ny rutin för beställning av produkten.• Nya kontaktuppgifter till Octapharma.	Petra Lindroos Kölqvist
-	År 2007	- Första utgåvan	Petra Lindroos Kölqvist

Granskare

Elin Drevik Hansson, Leg Sjuksköterska,
Fariba Baghaei, Överläkare

Innehåll

1	Bakgrund	2
2	Indikation	2
3	Dosering	2
4	Förberedelser	3
5	Administrering	3
6	Dokumentation	3
7	Blandbarhet	3
8	Biverkningar	3
9	Hållbarhet	3
10	Övrigt	3
11	Referenser	3

1 Bakgrund

Färskfrusen virusinaktiverad plasmaproduct. OctaplasLG finns i olika blodgrupper. Vid infusion följs regler för universalgivning av plasma, ex A, B, AB kan ges till pat. med blodgrupp O. RhD- negativ produkt ges till RhD-positiv patient.

2 Indikation

Hereditär TTP. Hereditär TTP är en genetisk sjukdom där gendefekten ärvs från båda föräldrarna. Enzymet ADAMTS 13 saknas. Detta enzym behövs för att klyva von Willebrands faktor multimerer (långa kedjor) vilket leder till trombocytaggregation.

Symtom är hemolys, trombocytopeni, CNS-påverkan, njurpåverkan, feber m.m.

3 Dosering

Patienten skall ha en aktuell, skriftlig behandlingsplan i Meliorjournal, i denna ska finnas;

- Ordination om vilken blodgrupp patienten ska erhålla.
- Antal enheter per behandlingstillfälle och hur ofta behandling ska ges.
- När prover ska tas, samt vilka prover som ska tas.

OctaplasLG® finns i enheter om vardera 200 ml och vid varje behandlingstillfälle ges 2 påsar. Behandling sker i normalfallet var 3:e vecka.

4 Förberedelser

OctaplasLG® förvaras fryst på transfusionsmedicin och tinas på beställning .

På behandlingsdagen vidtalas transfusionsmedicin via telefon, Tel. nr transfusionsmedicin 031-3421748/49, om att två Octaplaspåsar ska tinas upp. Detta tar ca 30 min. Fördel är om transfusionsmedicin meddelas vid vilken tid vi vill ha påsarna för att upptiningsapparaten ska vara ledig. När plasman är tinad är den klar och opalskimrande utan fasta partiklar.

Prover tas enligt ordination enligt behandlingsplan i regel vid varje behandling.

5 Administrering

Patienten tar själv vid behov antihistamin peroralt som premedicinering innan ankomst. OctaplasLG® infusion sker via blodaggregat. Varje påse administreras på 1-1,5 tim. Efter infusion ska patienten vara under observation i minst 20 min.

6 Dokumentation

OctaplasLG® återrapporteras i InterInfo enl rutin som vid rapportering av övriga blodkomponenter, dvs uthopp via externa program till Interinfo via Meliorjournal samt i Meliors läkemedelsmodul.

7 Blandbarhet

Ej blandbart med andra läkemedel

8 Biverkningar

Octaplas är en biologisk produkt och kan ge allergiska reaktioner såsom urtikaria, feber och frossa. För snabb infusion eller höga doser ökar risken för biverkningar. Eventuella biverkningar skall rapporteras och dokumenteras enligt befintliga läkemedelsrutiner med kopia till transfusionsmedicin.

9 Hållbarhet

Efter upptining kan OctaplasLG förvaras i rumstemperatur i 8 tim men bör användas omedelbart efter upptining för att minska risken för mikrobiologisk kontaminering

10 Övrigt

OctaplasLG® tillverkas av företaget Octapharma. Octapharma: Tel.nr 08-566 43 000. Dokument "Information om Octaplas" var god se Intranätet "Klinisk immunologi och transfusionsmedicin", "Remisser och anvisningar"

11 Referenser

- [octaplasLG \(Infusionsvätska, lösning \) • FASS-text | FASS Vård](#)
- Transfusionsmedicin
- Octapharma