

Senast reviderat: 2026-02-19 rev 6

Dokumentet gäller för: Sektionen för Hematologi och Koagulation

Innehållsansvarig: Ielaf Alwan, Leg. Apotekare

Godkänd av: Martin Stenson, Sektionschef

Midazolam peroral sedering

Revideringar i denna version

- Doserings text tillagt, inclusive maxdos.
- Inkompatibiliteter tillagd.
- Källor tillagd.

Revisionshistoria

Rev	Giltig från	Förändring	Författare
5	2020-02	<ul style="list-style-type: none">• Rutinen har bytt namn från Midazolam till Midazolam peroral sedering• Midazolam APL oral lösning ska användas istället för injektionsvätska Tillägg att maxdos är 10 mg	Ielaf Alwan
4	2019-02	<ul style="list-style-type: none">• Inga förändringar har gjorts jämfört med föregående revision.	Yvonne Björk
3	2015-12	<ul style="list-style-type: none">• Ny mall• Inga förändringar har gjorts jämfört med föregående revision.	Yvonne Björk
2	2013-06	-	Anna Wallström
1	-	-Första versionen	-

Granskare

Krista Vaht, Överläkare, BMT läkare

Martin Stenson, Sektionschef

Innehåll

1	Bakgrund	2
2	Dosering	2
3	Tabell.....	2
4	Administrering	2
5	Inkompatibiliteter	2
6	Källor	2

1 Bakgrund

Vid behov av sedering inför t ex benmärgsprov och CVK-inläggning kan man använda midazolam APL oral lösning. Detta ges efter läkarordination och ordinerar utifrån nedanstående tabell. Om patienten avviker från det normala i vikt eller allmäntillstånd bör dosen modifieras. Maxdos är 10 mg.

2 Dosering

Effekten av sederingen med Midazolam APL 1 mg/ml oral lösning kan variera individuellt beroende på patientens ålder och fysiska status. Tiden till effekt är vanligen 20–30 minuter för vuxna. Durationen är vanligen 20–40 minuter. Maxdos får ej överstiga 10 mg.

3 Tabell

Ålder i år	Vikt, kg	midazolam, mg
18-55	>60	10
	<60	7,5
56-70	>60	7,5
	<60	5

4 Administrering

Midazolam APL oral lösning 1 mg/ml används. 1 ml oral lösning innehåller 1 mg Midazolam. Midazolam ges peroralt 15–30 minuter före planerat ingrepp. Den sederande effekten varar i ca 60–90 minuter.

Inga extra kontroller behövs, men observera patienten under denna tid. Patienten får inte köra bil under resten av dagen.

5 Inkompatibiliteter

Blanda inte Midazolam APL 1 mg/ml oral lösning med basiska lösningar. Midazolam fälls ut i basiska lösningar.

6 Källor

- [Midazolam APL 1 mg/ml Oral lösning - AIDA - APL](#)