

Senast reviderat: 2026-03-27 rev 8

Dokumentet gäller för: Sektionen för Hematologi och Koagulation

Innehållsansvarig: Peter Johansson, Överläkare

Godkänd av: Martin Stenson, Sektionschef

## Venesectio

### Revideringar i denna version

Översyn av dokument, inga förändringar gjorda.

### Revisionshistoria

| Rev | Giltig från | Förändring   | Författare      |
|-----|-------------|--|-----------------|
| 7   | 2022-12     | <ul style="list-style-type: none"><li>Översyn av dokumentet, ingen förändring gjord i innehåll.</li></ul>  | Peter Johansson |
| 6   | 2020-11     | <ul style="list-style-type: none"><li>Ingen förändring gjord i innehåll. Revisionshistoria tillagt.</li></ul>  | Peter Johansson |
| 5   | 2017-11     | <ul style="list-style-type: none"><li>Översyn av dokumentet. Inga förändringar gjorda från föregående revision.</li></ul>  | Peter Johansson |
| 4   | 2015-10     | <ul style="list-style-type: none"><li>Översyn av dokumentet. Förändringar gjorda under kapitel "Tillvägagångssätt" Förändring av Bltr tagning: Blodtryck registreras både före och efter tappningen.</li><li>Borttaget: Ge patienten något att dricka före tappningen.</li></ul> | Peter Johansson |
| 3   | 2013-12     | <ul style="list-style-type: none"><li>Inga ändringar har gjorts jämfört med föregående version 2009-12-31.</li></ul>   | Peter Johansson |
| 2   | -           | -  | Peter Johansson |
| 1   | -           | -  | Peter Johansson |

### Granskare

Peter Johansson, Överläkare

Martin Stenson, Sektionschef

### Innehåll

|   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| 1 | Bakgrund .....         | 2 |
| 2 | Tillvägagångssätt..... | 2 |
| 3 | Dokumentation.....     | 2 |

---

## 1 Bakgrund

Det finns olika indikationer för venesectio. Det kan vara Polycytemia vera (PV), idiopatisk erythrocytos, pseudopolycytemi, hemokromatos etc.

## 2 Tillvägagångssätt

- ✓ Blodtryck registreras före tappningen.
- ✓ Kontrollera att patienten har ätit och druckit ordentligt innan.
- ✓ Patienten ska tappas liggande.
- ✓ Använd tappåse 500 ml för engångsbruk.
- ✓ Blodprover tas endast efter ordination.
- ✓ Efter tappningen ska patienten dricka ett glas vatten eller saft.
- ✓ Patienten kan gå hem direkt efter tappningen.

## 3 Dokumentation

Dokumentera i Melior: blodtryck samt tappad volym.