

Senast reviderat: 2026-03-27 rev 8

Dokumentet gäller för: Sektionen för Hematologi och Koagulation

Innehållsansvarig: Peter Johansson, Överläkare

Godkänd av: Martin Stenson, Sektionschef

Trombocytvärde vid Myeloproliferativ sjukdom – provtagningsfrekvens och åtgärd

Revideringar i denna version

- Översyn av dokument, inga förändringar gjorda.

Revisionshistoria

Rev	Giltig från	Förändring	Författare
7	2022-12	<ul style="list-style-type: none">• Översyn av dokumentet, inga ändringar gjorts sedan tidigare revision.	Peter Johansson
6	2020-11	<ul style="list-style-type: none">• Översyn av dokumentet, inga ändringar gjorts sedan tidigare revision.• Revisionshistoria och kapitelnumrering tillagt.	Peter Johansson
5	2018-11	<ul style="list-style-type: none">• Översyn av dokumentet• Inga ändringar gjorts sedan tidigare revision	Peter Johansson
4	2017-11	<ul style="list-style-type: none">• Översyn av dokumentet• Inga ändringar gjorts sedan tidigare revision	Peter Johansson
3	2016-05	<ul style="list-style-type: none">• Översyn av dokumentet• Inga ändringar gjorts sedan tidigare revision	Peter Johansson
2.1	2013-12	<ul style="list-style-type: none">• Inga ändringar har gjorts jämfört med föregående version 2009- 12-31.	Peter Johansson
2	2013-12	<ul style="list-style-type: none">• Inga ändringar har gjorts jämfört med föregående version	Peter Johansson
1	2009-12	-Första utgåvan av dokumentet	Peter Johansson

Granskare

Martin Stenson, Sektionschef

Innehåll

1	Syfte	2
2	Trombocytvärde (TPK) - Provtagningsfrekvens och åtgärd	2
3	Dokumentation	2

1 Syfte

Vägledning för sjuksköterska avseende planering av provtagning utifrån provsvar avseende patienter med myeloproliferativ sjukdom och myelosuppressiv behandling.

2 Trombocytvärde (TPK) - Provtagningsfrekvens och åtgärd

Varje patient har i Melior en behandlingsplan för sin sjukdom där aktuell behandling ska framgå. Det ska även framgå provtagningsfrekvens, målvärden avseende TPK-nivå, EVF samt uppföljning. Nedanstående är avsett som riktlinjer och vid osäkerhet kontaktas läkare.

De flesta patienter som har myelosuppressiv terapi har målvärde för TPK $<400 \times 10^9/L$. Följande riktlinjer gäller för dessa patienter:

- TPK $<200 \times 10^9/L$, kontakta läkare för eventuell dosreduktion av myelosuppressiv terapi.
- TPK $400\text{--}500 \times 10^9/L$, ändra ej ordination vid enstaka värde $> 400 \times 10^9/L$ och fortsatt med oförändrat provtagningsintervall. Vid upprepade förhöjda värden kontakta läkare.
- TPK $500\text{--}600 \times 10^9/L$, ändra ej ordination vid enstaka värde. Be patienten ta nytt prov om 2 veckor. Vid upprepade förhöjda värden kontakta läkare.
- TPK $> 600 \times 10^9/L$, läkarkontakt.

3 Dokumentation

Meliorjournal.