

Dokumentet gäller för: Sektionen för Hematologi och Koagulation

Innehållsansvarig: Jan-Erik Johansson, Överläkare, BMT-Överläkare, PD, CPD, ACFMD, MCFMD

Godkänd av: Martin Stenson, Sektionschef

A7 Bilaga 1 Pretransplantationsutredning, PTU inför AUTOLOG HSCT

Patient:

Personnr:

Inläggning:

Kond.start:

TX:

Utredningsresultat BMT-teamet tillhanda senast:

Undersökning alternativt provtagning enligt markerade rutor nedan

Hänvisning: Rutin A7 Pretransplantationsutredning samt C1-2 Intratekal profylax och behandling

Aktuell medicinlista om denna inte finns tillgänglig i SU:s journalsystem

Inom ca 1 månad före konditioneringsstart. Svar bevakas av hemsjukhus.

Undersökning / analys för sjukdomsutvärdering (t-ex. BM, MRD, IT, CT, PET-CT)

Röntgen pulm alternativt CT thorax

CT ansikte

UCG

Spirometri med CO-diff (vid klinisk misstanke om lungsjukdom)

Iohexolclearance (vid nedsatt njurfunktion utifrån eGFR Cyst-C och/eller eGFR krea)

EKG

Max 1 månad före konditioneringsstart. Provsvar bevakas av hemsjukhus.

Längd och vikt

HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc, Anti-HCV, HTLVI+II, anti-HIV 1 och 2, syfilisantikroppar

Virusserologi (IgG) CMV, EBV, HSV, VZV, morbilli, parotit, rubella, toxoplasma

Ferritin, S-Fe, TIBC, Transferrinmättnad

Holotranskobalamin, folsyra

S-elfores

Myelom även: Fria I ätta kedjor, s-elfores och u-elfores med immunofix

Myelom även: Benmärgsasp om inget utslag på elfores eller FLK

Myelom även: Röntgen eller MR vid misstanke vid nytillkommen myelommanifestation eller vid tidigare känd myelommanifestation

eGFR Cystatin-C relativ

NTproBNP

Fritt T4, TSH

S-kortisol (ange provtagningstid)

25-hydroxyvitamin-D

Svampodling: urin, feces, svalg eller insida kind

VRE och ESBL i feces

Max 2 veckor före konditioneringsstart. Provsvar bevakas av hemsjukhus.

CRP, SR

Hb, LPK, diff, TPK

LD

Na, K, jon Ca, Krea (inkl eGFR Kreatinin relativ), ASAT, ALAT, ALP, Bilirubin, Protein

PK, APTT

P-glucos

Remissionsbedömning: CR, CRu, PR, VGPR, stabil eller progr sjukdom angivet i journal

Läkarbedömning inför TX (se A7 punkt 3.1)

Max 1 vecka före konditioneringsstart:

Graviditetstest (kvinnor < 52 år)

Covid PCR nph+svalg < 72 timmar innan inläggning

PK, APTT, TPK < 72 timmar innan inläggning