

Senast reviderat: 2026-04-22 rev 1

Dokumentet gäller för: Sektionen för Hematologi och Koagulation

Innehållsansvarig: Catharina Lewerin, Överläkare

Godkänd av: Martin Stenson, Sektionschef

Premedicinering -lathund inför antikroppsbehandlingar - lymfom

*Se även Fass eller Nationella regimbiblioteket för mer
detaljerad beskrivning*

Revideringar i denna version

- Ny Rutin.

Revisionshistoria

Rev	Giltig från	Förändring	Författare
1	2026-04	-Ny Rutin	Catharina Lewerin

Granskare

Martin Stenson, Sektionschef

	Inför cykel 1	Inför cykel 2 osv.
Bispecifika AK [Epcoritamab (Tepkinly®),	Hela första cykeln under steroidskydd: <ul style="list-style-type: none"> • T Dexametason 16mg dag: 1–4 • T Paracetamol 1g • T Cetirizin 10mg 	Patient som uppvisade CRS av grad 2 eller 3 vid tidigare dos: <ul style="list-style-type: none"> • T Dexametason 15mg dag:1–4 • T Desloratadin 10mg • T Paracetamol 1g
Brentuximab vedotin (Adcetris®)	Ingen premedicinering som rutin	Om patienten reagerat cykel 1 ges premedicinering som vid Rituximab
Brentuximab vedotin (Adcetris®) i kombination med Bendamustin	<ul style="list-style-type: none"> • Betapred 8mg iv dag 1 och 2 • T Cetirizin 10mg • T Paracetamol 1g 	Som cykel 1
Daratumumab (Darzalex®)	<ul style="list-style-type: none"> • T Cetirizin 10mg • T Paracetamol 1g • T Dexametason 20mg (allt ges 1 - 3 h före) Patient med astma skall ha 10mg Montelukast.	Cykel 2 (from cykel 3 enbart vb) <ul style="list-style-type: none"> • T Cetirizin 10mg • T Paracetamol 1g • T Dexametason 20mg (allt ges 1 - 3 h före) Om patienten inte fått någon infusionsreaktion behövs således ingen premedicinering alls from kur 3.
Glofitamab (Columvi®)]	<ul style="list-style-type: none"> • Betapred 16mg iv • T Paracetamol 1g • T Desloratadin 10mg 	<ul style="list-style-type: none"> • T Betapred 16mg • T Paracetamol 1g • T Desloratadin 10mg
Mogamulizimab (Poteligeo®)	<ul style="list-style-type: none"> • T Paracetamol 1g • T Desloratadin 10mg Om infusionsreaktion ska det ges vid alla efterföljande behandlingar.	Som cykel 1
Mosunutuzumab (Lunsumio®)	Under samtliga doseringsdagar i cykel 1 skall patienterna en timme före varje infusion ta: <ul style="list-style-type: none"> • T Dexametason 20mg • T Paracetamol 1g • T Cetirizin 10mg 	Som cykel 1 Från kur 3 kan infusion ges utan premedicinering om patient EJ reagerat under föregående kurer.
Nivolumab (Opdivo®)	Ingen premedicinering som rutin.	Om patienten reagerat tidigare ges: <ul style="list-style-type: none"> • T Paracetamol 1g • Inj. Tavegyl 2mg iv (30 min före)

	Inför cykel 1	Inför cykel 2 osv.
Obinutuzumab (Gazyvaro®)	<p>Inför dag 1 + ev. (dag 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> Inj. Tavegyl 2mg iv (minst 30 min före) T Paracetamol 1g (minst 1 h före) Kortison: <ul style="list-style-type: none"> 100mg Prednisolon/Predison alt 20mg Dexametason alt 16mg Betapred (SIC) iv (minst 1 h före) 	<p>Efterföljande infusioner (om ej reaktion föregående kur):</p> <ul style="list-style-type: none"> T Paracetamol 1g tas 1 h före <p>(gäller även d 8 och 15 i cykel 1)</p> <p>Vid tidigare reaktion; se nationella regimbiblioteket. Om lymfocytos>25; paracetamol 1g, Tavegyl 2mg iv samt Betametason 16mg iv</p>
Pegasparginas (Oncaspar®)	<ul style="list-style-type: none"> T Betametason 0.5mg, 8st. T Desloratadin 5mg (1 timme före infusion.) <p>Obs! Fragminprofylax.</p>	
Polatuzumab vedotin (Polivy®)	<ul style="list-style-type: none"> Inj. Tavegyl® 2mg iv (minst 30 min före) T Paracetamol 1g (minst 1 h före) <p>Kortison behövs inte enligt FASS om patienten inte också får Rituximab.</p>	<ul style="list-style-type: none"> T Cetirizin 10mg T Paracetamol 1g
Rituximab (Rixathon®, Mabthera®)	<ul style="list-style-type: none"> Inj. Clemastin (Tavegyl®) 2mg iv (minst 30 min före start) T Paracetamol 1g (minst 1 h före) Kortison po som ingår i kur (minst 1 h före) alt inj. Betapred 4mg iv (minst 30 min före) <p>Montelukast 10mg övervägs vid astma</p>	<ul style="list-style-type: none"> T Cetirizin 10mg T Paracetamol 1g Kortison enligt kur 1, minst 1h före. <p>Om kortison ej ingår i kur ges: T Betapred 0.5mg 8st. (minst 1 h före) alt inj. Betapred 4mg iv (minst 30 min före)</p>
Tafasitamab (Minjuvi®)	<ul style="list-style-type: none"> Inj. Tavegyl® 2mg iv (minst 30 min före start) T Paracetamol 1g (minst 1 h före) Kortison po som ingår i kur (minst 1 h före) alt inj. Betapred 4mg iv (minst 30 min före). Vid dos #2 kan premedicinering ges po. - se Rituximab. 	<p>Om patienten inte får infusionsrelaterade reaktioner under de första tre infusionerna: är premedicinering valfri vid efterföljande infusioner.</p>