

# Intranasal behandling Midazolam 5 mg

Senast reviderad: 2025-10-02

Dokumentet gäller för: Akutmottagningen Sahlgrenska

Innehållsansvarig: Victoria Forsman, Läkemedelsansvarigsjuksköterska

Akutmottagningen Sahlgrenska

Granskad av: Antonia Panteli, VÖL Akutmottagningen Sahlgrenska

Godkänd av: Linnea Gustafsson, sektionschef Akutmottagningen Sahlgrenska

## Revideringar i denna version

Inga ändringar

## Syfte

Arbetsbeskrivning. I akuta fall där patientens tillstånd gör det svårt att administrera läkemedel intravenöst, är intranasal behandling ett alternativ som ger snabbt tillslag och är lätt att utföra.

## Arbetsbeskrivning

### Indikationer:

Krampanfall, akut oro och ångesttillstånd när intravenös behandling inte kan ges.


Tilläggsbehandling vid smärta

### Kontraindikationer:

Näsfraktur, kraftig näsblödning, överkänslighet mot bensodiazepiner eller respiratorisk insufficiens.



- Dra upp **Midazolam 5 mg/ml** 1 ml i en 1 ml spruta **efter ordination** vanligen 2,5mg-5 mg för vuxen
- Applicera sprutmunstycket (MAD Nasal Device) på sprutan.
- Vid behov sug rent näsan från ytligt sekret
- Spruta halva dosen (0.5ml) i ena näsborren och andra halvan (0.5ml) i andra näsborren
- Spruta in läkemedlet i näsan med riktning mot toppen av patientens öra (se bild) undvik septum.
- Spruta med tillräcklig kraft så att en fin dimma bildas
- Vid krampanfall som inte bryts eller otillräcklig effekt kan dosen upprepas (2,5mg-5mg).



## Ansvar

Sjuksköterskor på Akutmottagning Sahlgrenska. Vårdenhetschef ansvarar för att rutinen är känd och efterföljs.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Vårdenhetschef ansvarar för regelbunden uppföljning och utvärdering av verksamhetens rutiner.

Övriga avsteg från rutinen rapporteras i MedControl Pro.