NIHSS övervakningsblad

Pat id: Pers.nr: Namn:

		Datum:																							
Testtyp	**Poängbedömning**	**Klockslag:**																							
1 a. Medvetandegrad Enligt RLS-85	0. Vaken och alert (RLS 1) 1. Slö, men kontaktbar vid lätt stimulering (RLS 2) 2. Mycket slö, (RLS 3) 3. Coma. Patienten okontaktbar. (RLS 4-8)																								
1 b. Orientering Fråga om nuvarande månad och patientens ålder	0. Två rätt 1. Ett rätt. Ges även om intuberad/dysartri/annan språksvårigh. 2. Inget rätt. Ges om afasi eller coma.																								
1 c. Förståelse Ge kommando: Slut ögonen ! Knyt handen ! (icke paretiska sidan)	0. Två rätt 1. Ett rätt 2. Inget rätt																								
2. Ögonmotorik/ögonställning Observera först ögonställningen, testa sedan ögonrörelserna åt hö och vä sida. Om patienten inte lyder uppmaning, pröva Doll´s eye-manöver	0. U. a. 1. Partiell blickpares (dev conjugée) som kan övervinnas viljemässigt eller med Doll´s eye. Perifer ögonmuskelpares. 2. Komplett blickpares (dev conjugée) som ej kan övervinnas.																								
3. Synfält Använd konfrontationstest, t.ex. fingerräkning, eller genom att föra handen ”hotfullt” mot pats öga. Om pat är blind på ett öga, kontrollera det friska ögat.	0. U. a. 1. Partiell hemianopsi. Visuellt neglect vid bimanuell konfront. 2. Komplett hemianopsi 3. Blind bilateralt, oavsett orsak (inkl kortikal blindhet)																								
4. Facialispares Medvetandesänkt eller afatisk patient testas genom att skatta reaktionen på smärtsamt stimuli.	0. U. a. 1. Partiell central facialispares 2. Komplett central facialispares 3. Perifer facialispares																								
5. Pares i arm Pat i liggande. Lyft armarna 45°. Be pat hålla kvar i 10 sek. Testa ickeparetisk sida först! Amputation eller kontraktur ger 0 poäng.	0. Håller kvar i 10 sekunder 1. Sjunker inom <10 sek men når ej till sängen 2. Faller till sängen inom <10 sek men visst motstånd mot grav. 3. Armen faller omedelbart, men kan röras mot underlaget 4. Ingen rörlighet i armen	**Hö**	**Vä**	**Hö**	**Vä**	**Hö**	**Vä**	**Hö**	**Vä**	**Hö**	**Vä**	**Hö**	**Vä**	**Hö**	**Vä**	**Hö**	**Vä**	**Hö**	**Vä**	**Hö**	**Vä**	**Hö**	**Vä**
6. Pares i ben Pat i liggande. Rakt benlyft till 30°. Be pat hålla kvar 5 sek. Testa ickeparetisk sida först! Amputation eller kontraktur ger 0 poäng.	0. Håller kvar i 5 sekunder 1. Sjunker inom <5 sek men når ej till sängen 2. Faller till sängen inom <5 sek men visst motstånd mot grav. 3. Benet faller omedelbart, men kan röras mot underlaget 4. Ingen rörlighet i benet	**Hö**	**Vä**	**Hö**	**Vä**	**Hö**	**Vä**	**Hö**	**Vä**	**Hö**	**Vä**	**Hö**	**Vä**	**Hö**	**Vä**	**Hö**	**Vä**	**Hö**	**Vä**	**Hö**	**Vä**	**Hö**	**Vä**
7. Ataxi Testas med finger-näs och knä-häl. Avser endast cerebellär symtomatologi.	0. U. a. Används också om pares 1. Ataxi i en extremitet 2. Ataxi i två extremiteter																								
8. Sensibilitet (smärta) Testas med nål. Coma ger 2 poäng.	0. U. a 1. Lätt-måttlig nedsättning. 2. Svår eller total nedsättning, omedveten om beröring.																								
9. Språk/kommunikation Be pat beskriva bilden, namnge föremålen och läsa meningarna.	0. U. a. 1. Lätt – måttlig afasi, Svårigheter namnge, parafasier, etc. 2. Svår afasi, fragmentarisk, ja o nej 3. Stum, global afasi																								
10. Dysartri Be pat läsa ord från listan, tala inte om varför!	0. U. a. 1. Lätt dysartri, sluddrar på några ord eller är svårförståelig 2. Svår dysartri, oförståeligt tal eller mutistisk																								
11. Neglect (utsläckning) A: Utgå från tidigare testresultat. B: Bilat konfrontqion	0. U. a. 1. En modalitet nedsatt 2. Båda modaliteterna nedsatta eller svår ensidig utsläckning för en modalitet. Känner inte igen sin egen hand																								
SUMMA:																									

NIHSS sid 2 **Pat id:** Pers nr: Namn:

	Datum:																	
Testtyp	**Klockslag:**																	
1 a. Medvetandegrad Enligt RLS-85																		
1 b. Orientering Fråga om nuvarande månad och patientens ålder																		
1 c. Förståelse Ge kommando: Slut ögonen ! Knyt handen ! (icke paretiska sidan)																		
2. Ögonmotorik/ögonställning Observera först ögonställningen, testa sedan ögonrörelserna åt hö och vä sida. Om patienten inte lyder uppmaning, pröva Doll´s eye-manöver																		
3. Synfält Använd konfrontationstest, t.ex. fingerräkning, eller genom att föra handen ”hotfullt” mot pats öga. Om pat är blind på ett öga, kontrollera det friska ögat.																		
4. Facialispares Medvetandesänkt eller afatisk patient testas genom att skatta reaktionen på smärtsamt stimuli.																		
5. Pares i arm Pat i liggande. Lyft armarna 45°. Be pat hålla kvar i 10 sek. Testa ickeparetisk sida först! Amputation eller kontraktur ger 0 poäng.		**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**
6. Pares i ben Pat i liggande. Rakt benlyft till 30°. Be pat hålla kvar 5 sek. Testa ickeparetisk sida först! Amputation eller kontraktur ger 0 poäng.		**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**	**Hö** **Vä**
7. Ataxi Testas med finger-näs och knä-häl. Avser endast cerebellär symtomatologi.																		
8. Sensibilitet (smärta) Testas med nål. Coma ger 2 poäng.																		
9. Språk/kommunikation Be pat beskriva bilden, namnge föremålen och läsa meningarna.																		
10. Dysartri Be pat läsa ord från listan, tala inte om varför!																		
11. Neglect (utsläckning) A: Utgå från tidigare testresultat. B: Bilat konfrontation																		
SUMMA:																		