

Infektionsverktyget, rapportförslag

Mallar för uppföljning av användningen av antibiotika och förekomst av vårdrelaterade infektioner på verksamhet/enhet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

Antibiotikaordinationer:

Mall, ordinationsorsaker till antibiotikabehandling.....	Sida 2
Mall, antibiotikaval vid vanligaste ordinationsorsak.....	3
Mall, andel PcV+PcG vid samhällsförvärd pneumoni.....	4
Mall, andel ciprofloxacin vid afebril UVI.....	5

Peroperativ profylax:

Mall, antibiotikaval vid peroperativ antibiotikaprofylax.....	6
Mall, andel kloxacillin som peroperativ antibiotikaprofylax.....	7

Vårdrelaterade infektioner:


Mall, andel vårdrelaterade infektioner.....	8
Mall, andel vårdtillfällen med riskfaktor, förekomst av KAD.....	9
Registerutdrag för journalgranskning (Medarbetaruppdrag Kvalitetssäkring krävs)	10

Användbara funktioner i Infektionsverktyget:



Mall, ordinationsorsaker till antibiotikabehandling

Antal antibiotikaordinationer per ordinationsorsak under en tidsperiod på enheten



Information att följa upp (Y-axeln) välj:

1. Antibiotikaordinationer

Avgränsa uppföljningsinformation, markera:


2. Tidsperiod och välj tidsperiod
3. Organisatorisk enhet och välj enhet

Fördela uppföljningsinformation på (x-axel), markera:

4. Ordinationsorsak

Mall, antibiotikaval vid vanligaste ordinationsorsak

Antal antibiotikaordinationer per substans för en vanlig ordinationstyp under en tidsperiod på enheten



Information att följa upp (Y-axeln):

1. Antibiotikaordinationer

Avgränsa uppföljningsinformation, markera:


2. Tidsperiod och välj tidsperiod
3. Organisatorisk enhet och välj enhet
4. Ordinationsorsak och välj orsak (t.ex. lunginflammation)

Fördela uppföljningsinformation på (x-axel), markera:

5. Antibiotika och välj kemiska substansgrupper

Mall, andel PcG + PcV vid samhällsförvärvad pneumoni

Andelen bensylpenicillin och fenoximetylpenicillin av totala antal antibiotikaordinationer vid samhällsförvärvad pneumoni per kvartal på enheten



Information att följa upp (Y-axeln):

1. Antibiotikaordinationer

Avgränsa uppföljningsinformation, markera:

2. Tidsperiod och välj tidsperiod
3. Organisatorisk enhet och välj enhet
4. Första/efterföljande ordination, välj Endast första ordinationen
5. Antibiotika och välj Bensylpenicillin (J01CE01) och Fenoximetylpenicillin (J01CE02)
6. Ordinationsorsak, välj Lunginflammation
7. Vård/samhälle, välj Samhällsförvärvad

Fördela uppföljningsinformation på (x-axeln), markera:


8. Tid-år-kvartal (observera att första och sista kvartalet kan vara ofullständigt beroende val av tidsperiod)

Avgränsa nämnare, markera:

9. Visa uppföljningsinformation som andel av (nämnnare):
Antibiotikaordinationer
10. Ta bort markeringen på Antibiotika

Mall, andel ciprofloxacin vid afebril UVI

Andelen ciprofloxacin av totala antal antibiotikaordinationer vid afebril UVI per kvartal på enheten



Information att följa upp (Y-axeln):

1. Antibiotikaordinationer

Avgränsa uppföljningsinformation, markera:

2. Tidsperiod och välj tidsperiod
3. Organisatorisk enhet och välj enhet
4. Första/efterföljande ordination, välj Endast första ordinationen
5. Antibiotika och välj Ciprofloxacin (J01MA02)
6. Ordinationsorsak, välj Urinvägsinfektion utan feber

Fördela uppföljningsinformation på (x-axel), markera:


7. Tid-år-kvartal (observera att första och sista kvartalet kan vara ofullständigt beroende val av tidsperiod)

Avgränsa nämnare, markera:

8. Visa uppföljningsinformation som andel av (nämnnare):
Antibiotikaordinationer
9. Ta bort markeringen på Antibiotika

Mall, antibiotikaval vid peroperativ antibiotikaprofylax

Antal antibiotikaordinationer per substans vid peroperativ antibiotikaprofylax under en tidsperiod på enheten



Information att följa upp (Y-axeln):

6. Antibiotikaordinationer

Avgränsa uppföljningsinformation, markera:

7. Tidsperiod och välj tidsperiod

8. Organisatorisk enhet och välj enhet


9. Ordinationsorsak och välj peroperativ antibiotikaprofylax

Fördela uppföljningsinformation på (x-axel), markera:

10. Antibiotika och välj kemiska substansgrupper

Mall, andel kloxacillin som peroperativ antibiotikaprofylax

Andelen kloxacillin av totalt antal antibiotikaordinationer vid peroperativ antibiotikaprofylax per kvartal på enheten



Information att följa upp (Y-axeln):

1. Antibiotikaordinationer

Avgränsa uppföljningsinformation, markera:

2. Tidsperiod och välj tidsperiod
3. Organisatorisk enhet och välj enhet
4. Antibiotika och välj Kloxacillin (J01CF02)
5. Ordinationsorsak, välj Peroperativ antibiotikaprofylax

Fördela uppföljningsinformation på (x-axel), markera:

6. Tid-år-kvartal (observera att första och sista kvartalet kan vara ofullständigt beroende val av tidsperiod)

Avgränsa nämnare, markera:

7. Visa uppföljningsinformation som andel av (nämnnare): Antibiotikaordinationer
8. Ta bort markeringen på Antibiotika

Mall, andel vårdrelaterade infektioner

Andel vårdrelaterade infektioner av totala antalet vårdtillfällen under en tid per kvartal på enheten



Information att följa upp (Y-axeln):

1. Vårdtillfällen

Avgränsa uppföljningsinformation, markera:

2. Tidsperiod och välj tidsperiod
3. Organisatorisk enhet och välj enhet
4. Infektion och välj de tio första infektionerna (från Lunginflammation-vård till Neutropen feber)

Fördela uppföljningsinformation på (x-axel), markera:

5. Tid-år-kvartal (observera att första och sista kvartalet kan vara ofullständigt beroende val av tidsperiod)

Avgränsa nämnare, markera:

6. Visa uppföljningsinformation som andel av (nämname): Vårdtillfällen
7. Ta bort markeringen på Infektion

Mall, Registerutdrag från Infektionsverktyget

Syftet är att ta fram data på individnivå för att använda vid journalgranskning. Detta kräver dock att man har Medarbetaruppdrag Kvalitetssäkring.

1. Logga in i Infektionsverktyget med ID/SITHS-kort. Direktinlogg från SU intrasida möjlig.
2. Välj uppdrag Kvalitetssäkring (IT-behörighet "Medarbetaruppdrag Kvalitetssäkring" krävs).
3. Välj fliken Registerutdrag
4. Välj Exportera data till Excel
5. Välj lämpligt tidsintervall (exv 2022-01-02 – idag)
6. Välj filter Ordinationsorsak
7. Exportera data till Excel och öppna den genererade excelfilen (ibland behöver den exporteras två gånger).
8. I den exporterade excelfilen
 - a. Välj Aktivera redigering
 - b. Markera rad 3
 - c. Under menyn Data, välj Filtrera. (Rubrikerna på rad 3 ska nu vara försedda med rullgardinsmenyer)
 - d. Sortera efter önskemål i rullgardinsmenyerna (exv i kolumn G bocka ur "Annan antibiotikaprofylax" och "Perioperativ antibiotikaprofylax" för att få fram antibiotikaordinationer för behandling)
9. Nästa steg är vanligen att gå vidare med granskning i Melior.

I excelfil har varje antibiotikaordination som gjorts på din verksamhet under den aktuella tidsperioden har en egen rad. Kolumnerna visar personnummer, datum, ordinationsorsak, antibiotika, tidpunkter mm men också mer teknisk information. Alla kolumner används inte, man kan välja "dölj" eller "ta bort" för att få ett mer hanterligt dokument

Koppla postoperativa infektioner

- Behöver göras manuellt
- Gäller opererande specialiteter för uppföljning av postoperativa infektioner
- Kräver "Medarbetaruppdrag Kvalitetssäkring"
- Kan göras av kvalitetssjuksköterska eller motsvarande efter VO specifika rutiner