



Du kan gå i skolan, leka och röra dig som vanligt.

När slangen inte används kan du fästa den innanför kläderna med en liten tygpåse/väska, påsklämma i kläderna eller en extra tejpbitt på huden.

Var försiktig med slangen så den inte fastnar i något eller blir smutsig.

TIPS!

MediPrep, vårdsajten för barn och ungdomar. Enkel information om svåra saker:



1177, information om CVK



Min vårdplan, information om behandling och bland annat central venkateter:



Framtagen inom den nationella utbildningen i barnonkologisk vård för sjuksköterskor 2023.

Finansierad av Barncancerfonden

©

Helen Lidbeck

Josefin Nordh

Linnéa Håkansson

Emma Forsberg



**Karolinska
Institutet**

**BARNCANCER
FONDEN**



Till dig med CVK



Tecknat hus. Pixabay, CC-0.

Detta ska du tänka på när du är hemma

Du har rätt att veta

I denna broschyr står det hur du själv kan ta hand om din slang. Det står vad du bör tänka på och vad du ska göra om något går fel med slangen.

En CVK, vad är det?

CVK, central venkateter är en plastslang som opereras in i ett stort blodkärl nära hjärtat.

En del av slangen med koppling hänger utanpå kroppen och fästs med förband eller plåster.

Den kan sitta kvar i flera månader. Det kan tas blodprover ur den och du kan få cytostatika, andra mediciner, vätska och näring i den.

När du har en CVK slipper du få nålstick så ofta.




Bild över CVK. Cancer Research UK, CC BY-SA 4.0.

Vad gäller för dig?

En CVK innebär en ökad risk för infektioner. Det är viktigt att du och/eller dina föräldrar tittar på insticksstället varje dag.

Det finns en klämma på slangen som alltid ska vara stängd när den inte används.

Du kan duscha som vanligt om slangen är täckt med vattenavstötande plåster och plåstret kan behöva bytas efteråt. Om du vill bada får du fråga vårdpersonalen vad som gäller.

Kontakta vården direkt om:

- Slangen går sönder eller går av, sätt en klämma ovanför sprickan/skadan och ring sjukhuset.
- Det blöder där slangen går in under huden.
- Du har symtom på infektion såsom feber eller svullnad/rodnad där slangen går in under huden.

Omläggning av CVK

Om du har plåster över din CVK ska det bytas minst 1 gång i veckan. Vid behov kan slangen behöva läggas om oftare.

Du får hjälp av sjuksköterska på sjukhuset med omläggningen eller så får dina föräldrar eller du lära er att tvätta och lägga om din CVK hemma.

Prata med vårdpersonal eller din kontakt/konsultsjuksköterska för mer information om vad som gäller för just dig.



Exempel på plåster och tejpning. Privat bild.