

Ansvarig: Sårvårdsgruppen, Barncancercentrum

Version: 2

Gäller fr.o.m.: 260203

Skör hud vid cytostatikabehandling

Syfte

Minska inkontinensrelaterad dermatit (IAD) vid cytostatikabehandling på avdelning samt jobba förebyggande för att bibehålla en hel och intakt hud.

Beskrivning

Alla patienter som inkommer för cytostatikabehandling och använder någon typ av blöja eller inkontinensskydd löper större risk för negativ påverkan på huden i form av rodnad eller sår. Även patienter som inte använder blöja eller inkontinensskydd löper större risk för påverkan av utsöndringar via urinen. Våra patienter har ofta nedsatt immunförsvar och längre läkningsprocess om sår har uppkommit, därav är det av stor vikt att detta måste förebyggas.

Cavilon Barriärkräm

Cavilon barriärkräm är skapad för att ge ett långvarigt skydd mot olika kroppsvätskor samtidigt som den återfuktar huden. Alla patienter som inkommer för cytostatikabehandling ska få en tub kräm vid ankomst för att förbygga uppkomsten av rodnad eller sårig hud.

Krämen ska smörjas minst 2 gånger per dygn, men vid frekventa toalettbesök eller blöjbyten bör krämen smörjas efter varje gång. Går med fördel att kombineras med Inotyol salva som då appliceras efter Cavilon barriärkräm.



Cavilon No Sting barriärfilm

Cavilon no sting barriärfilm är framtagen för att skydda intakt hud samt runt sårkanter, från kroppsvätskor, irriterande ämnen samt olika typer av friktioner i upp till 72 timmar. Innehåller ingen alkohol vilket bidrar till att filmen inte svider vid applikation. Läggs runt sårkanter, men ej i öppna sår.

Barriärfilmen ska användas när man ser att huden börjar bli irriterad, rodnad och/eller skör samt runt sårkanter, ej i öppna sår. Barriärfilmen håller i upp till 72 timmar, men vid mycket frekventa toalettbesök eller blöjbyten kan man behöva lägga på upp till 1 gång per dygn. Går att kombinera med Inotyol salva som då appliceras efter Cavilon No sting.

Observera att spatlarna är för engångsbruk.



Postadress:


Barncancercentrum
Drottning Silvias barnsjukhus
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
416 85 Göteborg

Telefon:

031-343 45 22

Cavilon Advanced hudskyddsmedel

Cavilon Advanced hudskyddsmedel är skapad för att inge ett kraftfullt hudskydd för att täcka över och skydda intakt samt skadad hud och öppna vätskande sår. Filmen fäster på både torra, fuktiga samt våta hudtytor. Filmen håller för upprepad exponering för fukt och/ eller frätande irriterande ämnen. Cavilon Advanced hudskyddsmedel ska användas när huden i rumpan är mycket rodnad, uppluckrad, avskavd eller om sår redan uppkommit. Skapar en skyddande film som andas, gynnar läkning samt minskar smärtor som förknippas med utsöndringar. Cavilon advanced ska bara appliceras i 1 lager, luften torrt, annars blir den klabbig och hudveck riskerar att klistras ihop. Håller i upp till 72 timmar, men som nämnt ovan, vid frekventa byten eller toalettbesök kan man behöva åter applicera tätare, max 1 gång per dygn. Går med fördel att kombineras med Inotyol salva, som då appliceras efter Cavilon advanced. Observera att den är för engångsbruk.



3M™ Cavilon™ hudvårdslösningar

3M Ditt förstahandsval för att skydda patientens hud.

3M och Cavilon är varumärken som tillhör 3M Company. © 3M 2020. Med ensamrätt. OMG109953.

Postadress:

Barncancercentrum
Drottning Silvias barnsjukhus
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
416 85 Göteborg

Telefon:

031-343 45 22

Dokumentation – Plan för Hud, Vävnad

Vårdplan för Hud, Vävnad ska öppnas och användas på patienter som löper risk för skör eller skadad hud i samband med cytostatikabehandling. Där ska det dokumenteras vad patienten fått in. Se exempel nedan;

2024-02-07 10:42	PLAN FÖR HUD, VÄVNAD	Planerad utvärdering: 2024-02-11	Avdelning 321 och 322	Onkologi Barn (BONK01)
	Ssk Ssk1, Utbildning	Ssk	(sign ssk1)	
Hälsoproblem	Risk för hudskada i samband med cytostatikabehandling.			
Omvårdnads mål	Hel och intakt hud.			
OMVÅRDNADSÅTGÄRD				
Information, undervisning	Observera att vid frekventa blöbyten relaterat till mycket hydrering så kan nytt lager av Cavilon No sting barriräfilm läggas tidigare än var tredje dygn. Ej oftare än 1 gång per dygn.			
Skötsel	2024-02-01 - Lämnat in Cavilon Barriärkräm till familjen vid ankomst. Uppmanar till att smörja regelbundet vid blöbyten. 2024-02-04 - Uppmärksammar att huden i rumpen blivit röd och irriterad. Läger på ett lager av Cavilon No sting barriräfilm. Informerar familjen om att tvätta niktligt med vatten och tvättcrem vid byten.			
Speciell omvårdnad	2024-02-04 - Läger ett lager av Cavilon No sting barriräfilm. Nästa gång, 2024-02-07.			
Utvärdering av plan	Daglig utvärdering.			

Om användning av Cavilon Advanced hudskyddsmedel, måste det dokumenteras datum när man senast lade på ett skyddslager av produkten, detta för att minska risken för dubbla lager som i längden kan orsaka mer skada än nytta.

Ansvar

Gäller för personal på Barncancercentrum.

Ansvar för spridning och implementering har Sårvårdsgruppen.