

Schema för provtagning och kontroller i öppenvård efter alloge SCT

Nedan provtagning dokumenteras under ordinerade kontroller under pågående öppenvårdstillfälle i Melior. Start vid första besök i öppenvård efter SCT.

Ansvar:

- Läkare på öppenvården går igenom listan vid varje besök och justerar vid behov.
- SCT-läkare går igenom listan vid varje månadsbesök och justerar vid behov.

PATIENT: _____ DATUM FÖR SCT: _____

Prover	Provtagning Månad 1-3	Provtagning Månad 3-
Hb, LPK, TPK, neutrofila	1-3 ggr/v	
Reticulocyter	1 g/v	
Diff	1 g/v	
Na, K	1-3 ggr/v	
Bilirubin, ASAT, ALAT, ALP, Ca, Mg	1-3 ggr/v	
Kreatinin 1-3 ggr/v	1-3 ggr/v	
CRP		
Ferritin	1 g/v	
FK konc./CyA konc. 1-3 ggr/v	2-3 ggr/v	
PCR CMV & EBV tas i serum alltid till dag 100 - 1g/v, tas till CD4 är 0,2	1-2 ggr/v	
Haplo-SCT: PCR: CMV, EBV & Adeno – tas i serum 2ggr/vecka	2 ggr/v	
U-sticka	1 g/v	
Kontroller: Bltr, puls, pox, AF, temp liggande bukomfång	1 g/v	
Vikt	1 g/v	
Inspektion infarter	1 g/v	
Kuffa om knapp (byte knapp)	v.a.vecka (var tredje månad)	