

## Info beställning iohexol 4897

Anvisning

---

Det är viktigt att patienten följer nedanstående anvisningar före och under njurfunktionsundersökningen (lohexol). Detta för att undersökningen skall ge en rättvisande bild av njurfunktionen.

Patientens vikt och ålder ska framgå före beställning av funktionsundersökning lohexol.

### Förberedande information till patienten:

- Laboratoriemedicin NU-sjukvården utför **inte** lohexol-undersökning på barn under 14 år. Vid frågor kontakta medicinskt metodansvarig.
- Behöver INTE vara fastande.
- Ingen sjukhussäng finns att tillgå på Laboratoriemedicin.
- Får INTE ha genomgått någon annan undersökning där jodhaltigt kontrastmedel förekommit (såsom datortomografi, scintigrafi, kärl- eller njurröntgen) tre dygnet före denna undersökning. Vid kraftigt nedsatt njurfunktion kan ännu längre karenstid gälla.
- Får inte vara överkänslig mot jodhaltiga kontrastmedel. I dessa fall behöver medicinskt metodansvarig kontaktas.
- Får inte känna sig febrig. I förkommande fall kontaktas personal (ring tfn 010-453 27 18) och ingen undersökning med lohexol utförs. Ny tid ges!
- Tidmätningen mellan provtagningarna förenklas om patienten medtar egen klocka/telefon.
- Berätta för Laboratoriemedicins personal om eventuella andra undersökningar/ingrepp/händelser som är inplanerade under denna pågående funktionsundersökning

### Riktlinjer under själva undersökningen:

- Patienten får INTE utföra fysiska ansträngningar så länge undersökningen varar
- Patienten får INTE samtidigt genomgå undersökning där jodhaltigt kontrastmedel förekommer (se ovan)
- Vid kraftigt nedsatt njurfunktion eller vid onormal vätskeansamling är det ibland nödvändigt att fördröja provtagningen (provtagning vid flera tider, ibland upp till 24 timmar) för att få en korrekt mätning av lohexol.

Tveka inte att fråga oss på Laboratoriemedicin om något är oklart. Vi svarar gärna!