



Laboratoriemedicin

## UPPLYSNINGAR

Ta kontakt med laboratoriemedicin vid oklarheter.

### Reaktion vid transfusion av alla typer av blodkomponenter

En blankett, Transfusionskomplikation ska alltid fyllas i och sändas till laboratoriemedicin.

#### Övrigt <sup>1</sup>

Vid övrigt kan diagnos fyllas i om den kan tänkas påverka transfusionskomplikationen. Andra symtom som blödning, hetta, halssvullnad, domningar, stickningar samt slöhet/förvirring som kan tänkas förekomma, kan även anges vid Övrigt. Feberreaktioner av varierande längd och intensitet är ett vanligt symptom. Ange tidigare temperaturstegringar, storlek och duration, samt vad som har orsakat den. Medicinering som kunnat påverka förloppet, exempelvis betablockad mm., bör anges, liksom tidigare misstänkta transfusionskomplikationer.

#### Enhet/er <sup>2</sup>

Skriv in enhetens/ernas tappningsnummer (om flera komponenter har transfunderats samtidigt).

Ange även andra pågående/precis avslutade infusioner.

#### Blodprov för utredning tagna <sup>3</sup>

Vid alla reaktioner som rapporteras till Transfusionsmedicin ska ett 6mL EDTA-rör tas.

Vid lindriga reaktioner bedömer patientens ansvariga läkare om transfusionskomplikationen bör utredas eller inte.

Med provet ska följa Remiss Blodcentralen. Ange transfusionskomplikation på remissen.

Prov + remiss, samt väl försluten blodpåse i separat plastpåse, lämnas på Laboratoriemedicin. Med ledning av uppgifter om patientens symptom vid inträffad transfusionskomplikation avgör Laboratoriemedicin vilka åtgärder som ska vidtas.

Vid misstanke om transfusionskomplikationen till följd av bakteriellt kontaminerad komponent, måste blodpåsen snarast lämnas till Laboratoriemedicin. Odling på komponenten ombesörjes av Laboratoriemedicin. Odling på patientens blod (blododling) ombesörjes av vårdavdelningen.

#### \*Fel komponent/fel patient transfunderad

(ex transfusion till fel recipient).

Oavsett symptom måste detta rapporteras till Laboratoriemedicin.

OBS! I vissa fall kan symptom vara fördröjda.

Eventuell provtagning sker i samråd med Laboratoriemedicin.

Titel	Dok. nr.	Giltig fr.o.m.	Sida
Transfusionskomplikation	0845-7	2022-11-22	2(2)