

Vätskebehandling utan läkarordination på Akutmottagningen Sahlgrenska

Bakgrund och syfte

För att effektivisera omvårdnadsarbetet och säkerställa patientens vård i väntan på en första läkarbedömning, kan patienten ges intravenös vätskebehandling utan ordination. Obs försiktighet vid känd hjärtsvikt samt grav njursvikt.

Indikationer för parenteral vätska

- Sökorsak Akut buk som prioriteras lägst orange
- Systoliskt blodtryck <90mmHg
- Övriga patienter med sökorsak Akut buk och som har/haft illamående kräkningar eller av annan anledning haft svårt att försörja sig per os
- Infektion, feber >38,5 eller mer än 24h duration
- Patient med ketoacidosis eller hyperosmolärt syndrom
- Mb Addison med kräkningar, infektion eller feber
- Fastande patienter i väntan på undersökning
- Patienter som efter screening enligt FRESH bedöms som sköra och har svårt att försörja sig per os.

Generell ordination

Infusion Ringer-Acetat 1000ml infusionstakt 4-6 h.

Infusion Ringer-Acetat 1000ml infusionstakt 1 h som startdos till konstaterat hyperosmolärt syndrom eller ketoacidosis samt vid känd MB Addison med infektion/kräkning. **Stäm av med Ledningsläkare eller medicinjour så snart som möjligt avseende ytterligare behandling.**

Ansvar

Sjuksköterskor på Akutmottagningen Sahlgrenska. Läkemedelsgruppen på Akutmottagning Sahlgrenska ansvarar för att rutinen uppdateras.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Akutmedicin och geriatrik

Innehållsansvar: Viktoria Forsman, (vicfo), Sjuksköterska

Granskad av: Linnea Gustafsson, (lingu25), Sektionschef

Godkänd av: Jerker Persson, (jerpe3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9772-1276147733-238

Version: 2.0

Giltig från: 2025-06-11

Giltig till: 2027-06-11