

Gäller för: Verksamhet Medicin geriatrik och akutsjukvård Mölndal

Giltig från: 2025-11-06

Innehållsansvar: Georgios Mourtzinis, (geomo), Sektionschef

Giltig till: 2027-10-23

Granskad av: Dragana Loncar, (dralo1), Vårdenhetschef

Godkänd av: Pär Parén, (parpa1), Verksamhetschef

Iordningställande av läkemedel med risk för överkänslighet

Syfte

Lokalt tillägg till Iordningställande av läkemedel med risk för överkänslighet, dokumentnummer SU9790-1368942477-22 i mellanarkiv. Inga ändringar i denna version.

Utförande

Hjälpmedel

Vid iordningställande av antibiotika för intravenöst bruk, injektion skall röd mini-spike från Braun användas tillsammans med icumedical Spinning Spiros (eller motsvarande produkter) för att få ett slutet system. Vid iordningställande av antibiotika för intravenöst bruk, infusion skall Ecoflac Connect (eller motsvarande produkter) användas.

Läkemedel med arbetsmiljörisk - Överkänslighet

Riskbedömningar ska göras för läkemedel som kan innebära en arbetsmiljörisk att hantera (se HR-portalen för systemiskt arbetsmiljöarbete [Guide - Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM](#) samt punkt 34 i "Arbetsmiljökartläggning/rond – Checklista"). För att underlätta för chefer och andra vid SAM har Hälsan och Arbetslivet en gemensam guide för hälso- och arbetsmiljöarbete s.k. "Guide för Hälsa och Arbetsmiljö" där en stegvis beskrivning på hur inventering, riskbedömning, åtgärder, dokumentation och information samt uppföljning av åtgärder kan utföras.

Kom ihåg att läkemedel alltid kan utgöra en potentiell arbetsmiljörisk, eftersom det är frivilligt för läkemedelsföretagen att publicera

skyddsinformation. Mer information från LIF förmedlas av Sjukhusapoteket VGR/SU på förfrågan.

Kontakta gärna Sjukhusapoteket VGR/ SU för vägledning.

Läkemedel som kräver särskild utbildning/kunskap eller som av arbetsmiljöskäl behöver tillredas/administreras i speciella rum är exkluderade från nedanstående sammanställning, exempelvis:

- Anestesigaser (ATC-kod: N01AB, N01AX13, N01AX63) se AFS 1997:07, AFS 2001:7
- Läkemedel med radioaktiva ämnen
- Cytostatika (ATC-kod: L01)
- Inhalationsläkemedel som kräver särskild kunskap (ex. Ventavis-B01AC11, Pentacarinat-P01CX01)

Graviditet och amning

Läkemedel som vid intag påverkar fostret/barnet vid graviditet/amning kategoriseras i FASS.se. I vissa fall hänvisar FASS till lokala instruktioner för att få stöd med lokala instruktioner vid graviditet och amning hänvisas till AFS 2007:5 och HR inom SU, dessutom finns ett avsnitt i ”Guide för Hälsa och Arbetsmiljö” om graviditet och amning.

Relaterad information

[Hantera läkemedel med arbetsmiljörisk - cytostatika m fl - Sahlgrenska Universitetssjukhuset \(vgregion.se\)](#)

Granskare/arbetsgrupp

Maria Arosenius, vårdenhetschef, avdelning 238, Medicin och akutsjukvård Mölndal

Malin Heintz, vårdenhetschef, avdelning 236, Medicin och akutsjukvård Mölndal

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Medicin geriatrik och akutsjukvård
Möln dal

Innehållsansvar: Georgios Mourtzinis, (geomo), Sektionschef

Granskad av: Dragana Loncar, (dralo1), Vårdenhetschef

Godkänd av: Pär Parén, (parpa1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9772-1276147733-4

Version: 7.0

Giltig från: 2025-11-06

Giltig till: 2027-10-23