

Gäller för: Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra

Giltig från: 2026-04-28

Innehållsansvar: Annelie Raidla Lund, (annra23), Sjuksköterska

Giltig till: 2028-04-28

Granskad av: Alexander Haner, (aleha3), Överläkare

Godkänd av: Sofia Ekdahl, (sofek1), Verksamhetschef

Blod- och urinodlingar – AKUTEN

Förändringar sedan föregående version

Inga

Syfte

Förbättra patientsäkerheten genom säkrare rutiner gällande uppföljning och hantering.

Arbetsbeskrivning

Blododlingar

- Blododlingar ska **endast** tas på läkarordination, inte *i väntan på* ordination.
- Blododling **ska** tas innan intravenös antibiotika ges. Sjuksköterskan som ger antibiotikan ska försäkra sig om att det är gjort.
- Sköterskan frågar aktivt vid behov, t.ex. vid febril patient eller misstanke om sepsis.
- Viktigt att remissetiketten är korrekt ifylld gällande betalande avdelning och information angående insjuknande. Betalande avdelning ska vara den där patienten läggs in.
- Skriv alltid vilken antibiotika som ges och om patienten redan står på någon.
- Om patienten läggs in på avdelning är det viktigt att rapportera och dokumentera att blododling är tagen och skickad.

Urinodlingar

- Urinodlingar som ordineras och tas på patienter som sedan går hem skall följas upp på AKM. Kostnadsansvaret tillfaller AKM.
- Kopia på odlingssvar kan skickas till vårdcentral men vårdcentralen ska **inte** ställas som kostnadsansvarig.
- Viktigt att remissetiketten är korrekt ifylld gällande betalande avdelning och information angående insjuknande. Skriv alltid vilken antibiotika som ges.
- Glöm ej att dokumentera i journalen att odling är tagen och skickad.

- I de fall där det är svårt att få urinodling innan intravenös antibiotika ges och om patienten läggs in är det viktigt att detta dokumenteras och kommuniceras till avdelningen.
- Vid sepsislarm gäller att urinodling skall tas (via KAD eller RIK) om > 100ml finns i blåsan vid bladderscan.

Transport till lab

- Blododlingar skickas fortlöpande till lab, två åt gången via rörpost. De får inte stå i rumstemperatur och behöver komma snabbt in i värmeskåp.
- Urinprov kan förvaras i kylskåp. Urinodling skickas efter ordination direkt till lab. i rörposten.

Ansvar

Linjechefen ansvarar för att rutinen finns och följs.

Uppföljning, utvärdering och revision

Revisionsansvarig ansvarar för att rutinen följs upp. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning
Östra

Innehållsansvar: Annelie Raidla Lund, (annra23),
Sjuksköterska

Granskad av: Alexander Haner, (aleha3), Överläkare

Godkänd av: Sofia Ekdahl, (sofek1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9772-1276147733-54

Version: 12.0

Giltig från: 2026-04-28

Giltig till: 2028-04-28