

Gäller för: Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra

Giltig från: 2026-06-16

Innehållsansvar: Alexander Haner, (aleha3), Överläkare

Giltig till: 2028-06-04

Godkänd av: Sofia Ekdahl, (sofek1), Verksamhetschef

Intranasal behandling Midazolam - Akuten

Förändringar sedan föregående version

Inga

Syfte

I de akuta fall där patientens tillstånd gör det svårt att administrera läkemedel intravenöst, är intranasal behandling ett alternativ som ger snabbt tillslag och är lätt att utföra.

Arbetsbeskrivning

Indikation: Kramper, akut oro och ångesttillstånd, där intravenös behandling inte kan ges. Tilläggsbehandling vid smärta.

Kontraindikation: Näsfraktur. Kraftig näsblödning. Respiratorisk insufficiens.

Utförande:

1. Sug vid behov bort ytligt sekret i båda näsborrarna.
2. Kontrollera läkemedelsdosen **Midazolam 5 mg/ml**. Vuxendos 2,5-5mg.
3. Dra upp i 2 ml spruta. Vid kramp ges 0,5 ml i vardera näsborren.
4. Sätt in atomiseraren (MAD) i ena näsborren, tryck snabbt in halva dosen. Rikta spetsen bort från nässeptum, snett uppåt mot mellanrummet mellan ögat och örat. Upprepa i andra näsborren.
5. Om kvarstående kramp efter några minuter ges upprepningsdos 2,5-5 mg.



Ansvar

Respektive linjefe ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Uppföljning, utvärdering och revision

Revisionsansvarig ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning
Östra

Innehållsansvar: Alexander Haner, (aleha3), Överläkare

Godkänd av: Sofia Ekdahl, (sofek1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9772-1276147733-82

Version: 10.0

Giltig från: 2026-06-16

Giltig till: 2028-06-04