

Beyfortus (nirsevimab) för prevention av sjukdom orsakad av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) för nyfödda barn. Generell ordination.

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin

Bakgrund och syfte

Efter behovsbedömning av legitimerad personal med behörighet att administrera läkemedel får läkemedel administreras i enlighet med [SOSFS 2000:1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården](#) och i samråd med [NT-rådets rekommendation](#) inför säsongen höst/vinter 2025/2026. Rutinen föreskriver:

- att Beyfortus bör användas för prevention av RSV-infektion till riskgrupp 1, 2 och 3. Det vill säga spädbarn som är under 3 månader gamla under RSV-säsong samt till barn under 12 månaders ålder med tillstånd som ökar risken för allvarlig RSV-infektion.
- att Beyfortus ges till barn i riskgrupp 3 födda **från och med 10 september 2025**. Immuniseringen sker på förlossning/BB-verksamhet.
- att Beyfortus bör ges till barn upp till 24 månaders ålder som fortfarande har hög risk för allvarlig RSV-sjukdom under sin andra RSV-säsong, i

enlighet med de riktlinjer som sedan tidigare gäller för palivizumab (Synagis).

Förutsättningar

- Föräldrar har fått information om syftet med Beyfortus och de har givit sitt medgivande.
- Barnet bedöms välmående för hemgång.
- Läkemedlet skall vara tillgängligt.
- Tidsramar för administrering av Beyfortus fastställs av Folkhälsomyndigheten.
- Ordination enligt generella direktiv ska ske med stor restriktivitet och omprövas årligen.
- Administrerad dos ska dokumenteras i aktuellt journalsystem.

Utförande

Inför hemgång ges och delas ut enligt nedanstående ordination (SOSFS 2000:1)

Läkemedel	Dosering och administrationssätt	Maxdos per dygn	Indikation	Kontraindikation och anmärkning
Nirsevimab (Beyfortus) 50 mg i förfylld spruta	• <5 kg: 50 mg intramuskulärt	Engångsdos	Profylaktisk behandling med monoklonala antikroppar för prevention av sjukdom orsakad av RSV för alla barn under 3 månaders ålder under vintersäsong.	• Skall ej ges utanför tidsperiod bestämt av Folkhälsomyndigheten
Nirsevimab (Beyfortus) 100 mg i förfylld spruta	• ≥5 kg: 100 mg intramuskulärt			• Vårdnadshavare samtycker ej till behandling.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet AnOpIva neonatal barn

Innehållsansvar: Margrét Johansson Gudjonsdottir,
(margu145), Sektionschef

Granskad av: Maija Bry, (maebr1), Överläkare

Godkänd av: Angela Hanson, (angha), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9774-1570060579-1000

Version: 1.0

Giltig från: 2025-08-29

Giltig till: 2027-08-29