

Gäller för: Barnhjärtcentrum

Giltig från: 2025-09-18

Innehållsansvar: Thomas Bokemark, (thobo), Överläkare

Giltig till: 2027-09-17

Granskad av: Hanna Pahne, (hanpa11), Receptarie

Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

Artärspol Infusion

Revideringar i denna version

Inga ändringar gjorda.

Syfte

Säkra läkemedelshantering och administration.

Arbetsbeskrivning

ARTÄRSPOL Infusion

Tag 5 ml av Heparin 100 E/ml = 500 E och späd i 95 ml Natrium Klorid = 5 E/ml.

Ges som kontinuerlig infusion i artärnål 0,5 - 2 ml/h.

Kan även användas som CVK-flush.

Spädd lösning hållbart 4 dygn.

Ansvar

Verksamhetschef har det övergripande ansvaret. Vårdenhetschef och avdelningsöverläkare ansvarar för att rutinen är känd och följs på enheten. Sjuksköterska har egenansvar att följa rutin.

Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig läkare och sjuksköterska ansvarar för att rutinen följs. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras av läkare i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPro.

Granskare/arbetsgrupp

Thomas Bokemark, Vårdenhetsöverläkare, Barnhjärtcentrum

Hanna Pahne, Receptarie, Vårdfarmaci

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Barnhjärtcentrum

Innehållsansvar: Thomas Bokemark, (thobo), Överläkare

Granskad av: Hanna Pahne, (hanpa11), Receptarie

Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9774-1570060579-234

Version: 10.0

Giltig från: 2025-09-18

Giltig till: 2027-09-17