

Gäller för: Barnhjärtcentrum

Giltig från: 2024-09-27

Innehållsansvar: Thomas Bokemark, (thobo), Överläkare

Giltig till: 2026-09-27

Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

Dränagedragning efter hjärtoperation

Revideringar i denna version

Genomgående språkändringar.

Syfte

Säkra skötsel och handhavande vid dragning av dränage.

Arbetsbeskrivning

Förberedelser:

- Informera och förbered barnet och familjen om hur proceduren går till.
- Om Rapifen skall ges i samband med dränagedragning, läs noga igenom PM Rapifen först för att uppmärksamma svälttider och samordning med övrig smärtlindring exempelvis paracetamol, samt sedering med midazolam eller något opioidpreparat.
- Om barnet inte skall smärtlindras med Rapifen eller liknande preparat behöver barnet ej svälta inför proceduren.

Material:

- Sax.
- Pincett.
- Avklippt sugkateter.
- Descutansvamp.
- Rent vaselin (obruten tub).
- Kompresser.
- Tegaderm

Procedur:

- Utförs i enlighet med ren rutin (steril rutin ej nödvändig).

- Undvik att vara på barnets rum och i barnets säng, använd i första hand behandlingsrummet.
- Ha lämplig avledning tillhanda.
- Tvätta rent med Descutansvamp runt dränageinfarten.
- Thoraxkirurg eller delegerad sjuksköterska drar dränaget. Sätt en bit av en avklippt sugkateter ”i” suturen när den knyts för att underlätta suturtagning. Såvida inte gortexbitar är fastsatta i suturen. Dränaget kan avlägsnas med aktivt sug.
- Sätt ett tegaderm över dränagesåret, detta bör avlägsnas efter ett dygn. Vid långvarig dränbehandling där det finns risk att suturen inte går att dra åt tillräckligt hårt för att inte luft ska kunna sugas in via dränhålet tex: TCPC-op barn, tryck ut en klick vaselin över dränagesåret och täck med kompress, tejpa fast med breda häftor. Detta förband avlägsnas dagen efter.
- Suturer tas efter 7 - 10 dygn.
- Smärtskatta före, under och efter proceduren med adekvat smärtskattningsinstrument.
- Dokumentera procedurens förlopp, t ex effekt av smärtlindring.
- Belöna barnet!
- Tåt tillsyn av barnet tills eventuell effekt av midazolam/opioid har avtagit.
- Som regel skall lungröntgen utföras dagen efter, på läkarordination.

Ansvar

Verksamhetschef har det övergripande ansvaret. Vårdenhetschef och avdelningsöverläkare ansvarar för att rutinen är känd och följs på enheten. Sjuksköterska har egenansvar att följa rutin.

Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig läkare och sjuksköterska ansvarar för att rutinen följs. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras av läkare i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPro.

Granskare/arbetsgrupp

Thomas Bokemark, Vårdenhetsöverläkare, Barnhjärtcentrum

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Barnhjärtcentrum

Innehållsansvar: Thomas Bokemark, (thobo), Överläkare

Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9774-1570060579-246

Version: 6.0

Giltig från: 2024-09-27

Giltig till: 2026-09-27