

Gäller för: Barnhjärtcentrum

Innehållsansvar: Ewelina Wadman, (ewewa1), Barnsjuksköterska

Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-03

Giltig till: 2026-09-30

Waran behandlingsstrategi

Revideringar i denna version

Inga ändringar.

Syfte

Säkerställa att en god och säker vård och handläggning bedrivs i samband med insättning av Waranbehandling.

Arbetsbeskrivning

Sprida etablerade rutiner vid insättning av Waran samt uppföljning och dokumentation av Waran.

Under sjukhusvistelsen:

- Kirurgen bör överväga tidig dragning av pacemakertrådar på de barn som ska behandlas med Waran.
- Waran ska sättas in direkt när barnet börjar äta per os. Fortsätt med Heparin injektioner tills PK ligger inom målvärdet vid 2 efterföljande kontroller.
- PK tas två gånger under första veckan, därefter dagligen tills PK stabilt inom målområdet. Därefter PK prover endast enligt ordination.

Inför hemgång:

I god tid ta kontakt med kontaktsjuksköterskan på hjärtmottagningen som informerar om det praktiska handhavandet samt information av AVK- behandling

Alla patienter där Waran medicinering ordineras på hjärtmottagningen är inskrivna i Journalia. För att läsa logga in i Melior. Ta upp patienten och gå in under externa program, välj Journalia- AVK. Där finns patientens tidigare ordinationer att läsa.

Familjen informeras att provet på lab bör tas på morgonen. Om Labprovet tas senare under dagen kommer resultatet inte kunna ges förrän dagen efter om någon dosförändring bör ske.

Tas prov på annan ort och svaret faxas hit skrivs svaret manuellt in i Journalia och familjen meddelas i första hand per brev alt via telefonsamtal. Om PK ligger utanför intervall kontaktas familjen via telefon samma dag.

Familjen får en informationslapp med telefonnummer till hjärtmottagningen. Om prov ska tas på annan ort än Drottning Silvias barnsjukhus skrivs remiss till annan vårdcentral/laboratorium av sjuksköterska på hjärtmottagningen.

Kontroll av PK-värdet under helgen bör undvikas, Se Journalia via Melior. Vid behov och akuta situationer se i pärm på hjärtmottagningen. Där finns alla patienter som är inskrivna i Journalia med behandlingsindikation, behandlingsintervall och behandlingstid och om behov av Fragmin föreligger.

De patienter där ordinationer sköts via annat sjukhus får vidare information av ansvarig sjuksköterska på hemorten. Informera kontaktsjuksköterska på hemorten.

Ansvar

Verksamhetschef har det övergripande ansvaret. Vårdenhetschef och avdelningsöverläkare ansvarar för att rutinen är känd och följs på enheten. Sjuksköterska har egenansvar att följa rutin.

Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarig läkare och sjuksköterska ansvarar för att rutinen följs. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras av läkare i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPro.

Granskare/arbetsgrupp

Ewelina Wadman, Barnsjuksköterska, Barnhjärtcentrum

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Barnhjärtcentrum

Innehållsansvar: Ewelina Wadman, (ewewa1), Barnsjuksköterska

Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9774-1570060579-310

Version: 10.0

Giltig från: 2024-10-03

Giltig till: 2026-09-30