OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Verksamhet Kirurgi barn
Innehållsansvar: Malin Karlsson Leidzén, (malle2), Sektionsledare
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-08-28
Giltig till: 2028-08-28

Navelvård hos nyfödda

Förändringar sedan föregående version

Redaktionella uppdateringar

Syfte

Undvika infektioner i närliggande operationsområde samt identifiera infekterad navel.

Arbetsbeskrivning

Daglig inspektion av naveln skall ske under vårdtiden. Det nyfödda barnets navel ska inspekteras dagligen i samband med blöjbyte. Detta görs för att förebygga eventuell infektion i närliggande operationsområde.

Genomförande

- Naveln ska inspekteras dagligen samt hållas ren och torr, då den alltid är koloniserad med bakterier från barnets miljö.
- Navelstumpen torkar normalt och faller av inom 1 till 2 veckor efter födseln. Lite blödning, fukt eller svag lukt när stumpen håller på att lossna är vanligt och oftast normalt.
- Huden runt naveln ska vara blek.
- Om naveln är fuktig eller kladdig rengörs den med tvål och vatten en gång om dagen. Torka torrt.

Illaluktande navel

Om naveln inte hålls tillräckligt torr startas en förruttnelseprocess med ökad risk för infektion.

Tvätta naveln med Klorhexidinsprit 5 mg/ml en gång dagligen tills förbättring av symtomen.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Infekterad navel

Vid tecken på infektion såsom periumbilical (området runt naveln) rodnad, svullnad eller sekretion kan provtagning vara aktuell. Tvätta en till två gånger dagligen med Klorhexidinsprit 5 mg/ml.

Ansvar

Gäller för all hälso-och sjukvårdsperonal inom verksamhetsområde Kirurgi Barn, Drottning Silvias barnsjukhus, SU/Östra. Verksamhetschefen ansvarar att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOFS 2011:9

Uppföljning, utvärdering och revision

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Granskare/arbetsgrupp

Malin Leidzén, barnsjuksköterska, Verksamhet Kirurgi barn, Område 1/SU, innehållsansvarig

Linus Jönsson, överläkare, Verksamhet Kirurgi barn, Område 1/SU, innehållsgranskare

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Kirurgi barn

Innehållsansvar: Malin Karlsson Leidzén, (malle2), Sektionsledare

Granskad av: Malin Karlsson Leidzén, (malle2), Sektionsledare, Linus Jönsson, (linjo26), Överläkare

Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9774-1570060579-401

Version: 7.0

Giltig från: 2026-08-28

Giltig till: 2028-08-28