

Gäller för: Verksamhet Kirurgi barn

Giltig från: 2026-04-30

Innehållsansvar: Per Larnert, (perla37), Överläkare

Giltig till: 2028-04-30

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

# Ortopediska förband postoperativt

## Förändringar sedan föregående version

Inga.

## Syfte

Förebygga sårinfektioner och främja en god sårhäkning.

## Arbetsbeskrivning

Undvik förbandsbyte de två första dyggen.

### Första dygnet:

Om sårvätska rinner ut ur förbandet, förstärk då med plastfilm (tegaderm), det förhindrar att bakterier skall komma in i förbandet. Försök att röra förbandet så lite som möjligt. Vid stort läckage, skall ansvarig läkare kontaktas för att få ordination på att lägga om såret. Operationer som är utförda i blodtomt fält, skall vara lindade tills dagen efter operation. Förstärk med absorptionsförband + elastisk linda vid läckage.

**Steril omläggning:** Tvätta sår och omgivande hud med Descutan. Torka torrt med steril kompress. Vid behov av förbandsbyte flera gånger samma dygn, Descutan max en gång/dygn. Ofta räcker det att torka torrt med steril kompress. Ta inte bort steristrips som ej har lossnat av sig självt. Förstärk med ytterligare steristrips vid behov.

Förband: Aquacel (4 lager) + absorptionsförband + steril plastfilm/Aquacel surgical.

Vid infektionstecken kontakta ansvarig läkare för ställningstagande till sårodling eller eventuellt annan åtgärd.

### Dag 2-7:

**Ren rutin:** Tvätta med Descutan eller Nacl.9mg/ml.

Förband: Aquacel + plastfilm och vid behov även byte av vissa steristrips som har lossnat av sig självt.

**Vid hemgång:**

Vid behov, byte av förband till Op-site (plastfilm med kompress) och vid behov byte av vissa steristrips. Skicka med ett Op-site förband vid hemgång.

**Relaterad information:**

Dokumentera i vårdplanen om eventuella förändringar av operationssåret.

## Ansvar

Gäller för all hälso- och sjukvårdspersonal inom verksamhetsområde Kirurgi Barn. Drottning Silvias barnsjukhus, Område 1/SU. Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOFS 2011:9.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen ansvarar ytterst för revision/uppföljning av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

## Granskare / Arbetsgrupp

Per Larnert, läkare ortopedi, Område 3/SU, innehållsansvarig.

Lotta Olsson, barnsjuksköterska, Kirurgiavdelning barn, Verksamhet Kirurgi barn, Område 1/SU, innehållsgranskare.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Kirurgi barn

**Innehållsansvar:** Per Larnert, (perla37), Överläkare

**Granskad av:** Per Larnert, (perla37), Överläkare, Lotta Olsson, (lotol1), Barnsjuksköterska

**Godkänd av:** Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9774-1570060579-408

**Version:** 12.0

**Giltig från:** 2026-04-30

**Giltig till:** 2028-04-30