

Gäller för: Verksamhet Kirurgi barn

Giltig från: 2025-02-05

Innehållsansvar: Sofia Sjöström, (sofsj), Universitetssjukhusöverläkare

Giltig till: 2027-02-05

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

# Oxibutynin – vid blåskrämp

## Förändringar sedan föregående version

Inga.

## Syfte

Vid blåskrämp i samband med kateterbehandling efter urologiska operationer kan Oxibutynin hydroclodid® 0,5mg/ml ges efter ordination av läkare. Detta ger en lokal avslappning i blåsan.

## Arbetsbeskrivning

Dosering: < 1 år 1ml x 2  
> 1 år 2ml x 2

- Spola efter med 5 ml NaCl.
- Katetern ska vara stängd 20-30 minuter efter installation.

## Ansvar

Gäller för all hälso- och sjukvårdspersonal inom verksamhetsområde Kirurgi barn. Drottning Silvias barnsjukhus, SU/Östra.

Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOFS 2011:9.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Verksamhetschefen ansvarar ytterst för revision/uppföljning av innehållet i rutinen. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

## Granskare

Sofia Sjöström, överläkare, Verksamhet Kirurgi barn, Område 1/SU, innehållsansvarig.

Ulrika Svenninghed, Uroterapeut/specialistsjuksköterska, Uro-tarmstomimottagning barn, Verksamhet Kirurgi barn, Område 1/SU, innehållsgranskare.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Kirurgi barn

**Innehållsansvar:** Sofia Sjöström, (sofsj),  
Universitetssjukhusöverläkare

**Granskad av:** Sofia Sjöström, (sofsj),  
Universitetssjukhusöverläkare, Ulrika Svenninghed, (ulrsv8),  
Uroterapeut

**Godkänd av:** Cathrine Gatzinsky, (catwi3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9774-1570060579-409

**Version:** 12.0

**Giltig från:** 2025-02-05

**Giltig till:** 2027-02-05